

اثربخشی مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود بر نشخوار فکری، خصومت و شرم در زنان مبتلا به HIV

چکیده

زمینه: زنان مبتلا به HIV به دلیل مشکلات جسمی و روانی، احساسات و هیجانات منفی را تجربه می کنند. در سال های اخیر شفقت به خود، به عنوان راهی برای تعدیل احساسات منفی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود بر نشخوار فکری، خصومت و شرم در زنان مبتلا به HIV انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود و از روش نمونه گیری غیر تصادفی - هدفمند و گمارش تصادفی استفاده شد. بدین منظور ۶۰ نفر زن مبتلا به HIV به صورت هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش ده جلسه ۹۰ دقیقه ای مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود را هفته ای یکبار دریافت کرد. ابزار اندازه گیری، شامل پرسشنامه نشخوار فکری تراپل و کمپل (۱۹۹۹)، خصومت ردفور (۱۹۹۸) و شرم درونی شده کوک (۱۹۹۳) بود که توسط گروه نمونه در دو مرحله قبل از مداخله و پایان مداخله جمع آوری شد.

یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که مهارت آموزشی شفقت به خود بر کاهش خصومت و شرم در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون موثر می باشد ($p < 0/01$). در نشخوار فکری بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوتی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: به نظر می رسد مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود، می تواند در کاهش خصومت و شرم زنان مبتلا به HIV موثر است. بنابراین این روش برای بهبود علائم روانشناختی زنان مبتلا به HIV پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی: درمان شفقت به خود، نشخوار فکری، خصومت، شرم، بیماری HIV.

^۱ دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

^۲ دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

^۳ استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

^۴ استاد روانپزشکی، مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

* نشانی نویسنده مسئول:

گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

نشانی الکترونیک:

far.Keshavarzi@Gmail.Com

مقدمه

نادیده گرفته شود و فرد به جای اجتناب از تجربه هیجانات آزار دهنده، مهربانانه آنها را بپذیرد (۱۰). افزایش مهربانی با کاهش انزوا و ذهن آگاهی مرتبط است و عاملی برای افزایش سلامت روانی می‌باشد (۱۴). داشتن احساس مشترک و نگرش مشفقانه نسبت به خود و دیگران موجب کاهش آسیب‌ها و بهبود روابط بین فردی می‌شود (۱۵). وقتی فرد نسبت به خود مهربان می‌شود سازگارتر شده و به سلامت عاطفی و روانی بیشتری دست می‌یابد (۱۶) سازگاری و مهربانی موجب می‌شود تا فرد مراقبت از خود را جایگزین انتقاد و سرزنش کند (۱۷). شفقت به خود، یک ویژگی ذاتی می‌باشد اما می‌توان آن را با آموزش افزایش داد (۱۸). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که مهارت آموزی مبتنی بر درمان شفقت بر کاهش شرم، نشخوار فکری و خود انتقادی موثر است (۱۸) و به فرد کمک می‌کند تا با حفظ دیدگاه عینی، احساسات منفی و تغییرات ناخوشایند زندگی را بپذیرد (۱۹). تاکنون پژوهش‌های متعددی به منظور تعیین اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری بر سلامت روان بیماران مبتلا به HIV صورت گرفته است (۱۹). با توجه به اینکه شفقت به خود به عنوان یکی از درمان‌های موج سوم شناختی - رفتاری موثر در سال‌های اخیر در مورد بیماران به شدت مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر، توجه به سلامت روان زنان مبتلا به HIV الزامی است، اهمیت و ضرورت این پژوهش آشکار می‌شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر شفقت به خود بر کاهش نشخوار فکری و زیر مقیاس‌هایش، کاهش خصومت و شرم در زنان مبتلا به HIV بود.

روش کار

روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند و گمارش تصادفی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی زنان مبتلا به بیماری HIV تحت درمان دارویی کامل ضد ویروس HIV بستری در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران در سال ۹۸-۱۳۹۷ بودند. پس از تایید طرح پژوهشی در شورای پژوهشی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری از میان زنان مبتلا به بیماری HIV، ۶۰ نفر زن مبتلا به HIV به صورت غیر تصادفی و هدفمند و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش (۳۰ نفر) و گروه گواه (۳۰ نفر) قرار گرفتند. مشکلات ناشی از بیماری موجب ریزش تعدادی از شرکت‌کنندگان قبل از شروع پژوهش گردید. به علت اینکه حجم گروه آزمایش ۳۰ نفر بود و انجام گروه درمانی عملاً برای ۳۰ نفر صحیح نمی‌باشد، بیماران به ۶ گروه ۵ نفری تقسیم شدند. بیماران گروه آزمایش ده جلسه (۹۰ دقیقه‌ای) آموزش مهارت شفقت به خود را هفته ای یکبار دریافت کردند (جدول ۱). ضمن ارائه توضیحات کافی درباره پژوهش، کسب رضایت آگاهانه

در سال‌های اخیر میزان ابتلای زنان به بیماری HIV افزایش یافته است. احتمال ابتلا به بیماری HIV، در زنان به دلیل عوامل بیولوژیکی، محیطی و جنسی بیشتر از مردان است. ابتلا به بیماری در زنان به دلیل آسیب پذیری بالا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس آمار احتمال انتقال ویروس از مرد به زن ۲۰ برابر بیشتر از انتقال این بیماری از زن به مرد است (۱). اکثر زنان مبتلا، قادر به تحمل و کنار آمدن با مشکلات ناشی از بیماری نمی‌باشند (۲). بیش از ۷۰٪ از زنان مبتلا به بیماری HIV توسط شریک زندگی خود و گروهی دیگر از طریق رفتارهای پرخطر جنسی به بیماری مبتلا می‌شوند (۳). در سال‌های اخیر ابتلا از طریق رفتارهای پرخطر جنسی افزایش یافته است (۴) بیماری موجب اختلال در عملکرد و روابط زناشویی، اعتماد به نفس، خلق و مشکلات اقتصادی و شغلی می‌شود (۵). زنان مبتلا به HIV علاوه بر مشکلات جسمی با مشکلاتی مانند نشخوار فکری^۱، خصومت^۲، شرم^۳، فقر و افسردگی مواجه می‌شوند. بیمارانی که نشخوار فکری و خود ارزیابی منفی بیشتری نسبت به خود دارند کمتر نسبت به خود شفقت دارند (۶). نشخوار فکری، یکی از انواع الگوهای ناسازگارانه در اختلالات هیجانی است که زنان مبتلا به HIV آن را تجربه می‌کنند. نشخوار فکری، افکار تکراری، منفی و غیر قابل برگشتی است که همراه با خلق منفی بوده و بدنبال رویدادهای زندگی ایجاد می‌شود (۷). زنان مبتلا به HIV احساس یک فرد قربانی را دارند. این احساس موجب بروز احساس خصومت می‌گردد. خصومت، یک سازه روانشناختی است که زنان مبتلا به بیماری HIV آن را با تعداد زیادی از هیجانات مانند پرخاشگری، خشم، آزرده‌گی، بدگمانی، تحریک پذیری و نفرت تجربه می‌کنند (۸). بین شرم و خصومت رابطه وجود دارد (۹). شرم، عاطفه دردناک قدرتمندی است که وجود فرد را در بر می‌گیرد. شرم می‌تواند بیرونی (عزت نفس) یا درونی (کمرویی) باشد (۱۰). مهارت آموزی مبتنی بر درمان شفقت به خود^۵ از سوی کریستین نف در سال ۲۰۰۷ معرفی شد (۱۱). در این روش فرد آموزش می‌بیند، تا افکار و تصاویر تسکین بخش بیرونی را درونی کند و در واکنش به عوامل بیرونی بتواند درون خود را آرام سازد (۱۲). شفقت به خود^۶ به فرد کمک می‌کند تا در موقعیت‌های چالش انگیز اجتماعی مشکلات کمتری را تجربه کند و رضایت بیشتری از زندگی داشته باشد (۱۳). از طرفی شفقت به خود موجب کاهش هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت می‌شود (۱۱). آگاهی متعادل و روشن از تجارب زمان حال باعث می‌شود تا جنبه‌های دردناک یک تجربه

۱. Human immunodeficiency virus
۲. Rumination
۳. Hostility
۴. Shame
۵. Self-Compassion skill training
۶. Self-Compassion

ردفورد- ویلیامز ساخته شده است (۱۹۹۸) و دارای ۱۲ عبارت است. پاسخدهی به این پرسشنامه در مقیاس بله- خیر می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه در ایران (در یک گروه ۲۰ نفره)، با ضریب باز آزمایی ۰/۸۲ و ضریب همسانی ۰/۸۵ گزارش شده است. روایی محتوای آن نیز مورد تایید و مطلوب گزارش شده است و پایایی آن طبق آلفای کرونباخ بالای ۰/۹۰ ذکر شده است (۲۲).

پرسشنامه شرم درونی شده کوک^{۱۱} : ISS^{۱۲} این پرسشنامه توسط کوک (۱۹۹۳) تهیه شد. شامل ۳۰ ماده، شامل دو خرده مقیاس کمروبی و عزت نفس است. پاسخ به هر ماده در مقیاس لیکرت ۵ درجه ای می باشد. نمره های بالا در این مقیاس نشان دهنده بی ارزشی، بی کفایتی، احساس حقارت، پوچی، تنهایی و نمره پایین نشان دهنده اعتماد به نفس بالا است. رجبی و همکارانش در ایران نمره میانگین ۲۲,۳۴ و انحراف معیار ۲,۲۹ ضریب پایایی آلفای کرونباخ نمره کل را ۰/۹۰ در خرده مقیاس های عزت نفس ۰/۹۴، کمروبی ۰/۹۰ گزارش کردند و در نمره کل شرم درونی شده ۰/۹۰ در مردان ۰/۸۹ و زنان ۰/۹۱ ذکر شده است (۲۳).

یافته‌ها

درصد فراوانی و اطلاعات دموگرافیک زنان مبتلا به HIV در جدول ۲- گزارش شده است. میانگین سن زنان مبتلا به HIV ۳۸/۷۳ سال بود. از نظر تحصیلات ۴۸/۳۴ درصد از آنان تحصیلات زیر دیپلم، ۳۵ درصد دیپلم و ۱۶/۶۶ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. ۱۰ درصد از زنان مبتلا به HIV مجرد، ۴۰ درصد متأهل و ۵۰ درصد بیوه و مطلقه بودند. ۵۱/۶۶ درصد فاقد فرزند بودند، ۳۵ درصد دارای ۱ تا ۲ فرزند و ۱۳/۳۴ درصد دارای ۳ فرزند یا بیشتر بودند. بین گروه آزمایش و کنترل از نظر سن، وضعیت تاهل و تعداد فرزندان اختلاف معنادار مشاهده نشد.

برای پاسخ به سه پرسش اصلی پژوهش حاضر، آزمون های آماری زیر انجام شد که یافته‌ها در طی جداول زیر آمده است. همانطور که نتایج جدول ۳- نشان می‌دهد، با توجه به سطح معناداری ($p < 0/01$) آزمون های اثر پیلائی، لامبدای ویلکز، اثر هلتنینگ، بزرگترین ریشه قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس مجاز می‌باشد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف عادی بودن توزیع متغیرهای نشخوارفکری (تمرکز بر خود و خود ارزیابی منفی)، خصومت و شرم را در سطح معناداری ($p < 0/01$) در دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد. پیش فرض تساوی واریانس دو گروه آزمایش و کنترل توسط آزمون لوین تایید شد.

یافته‌های جدول ۴-، نمره میانگین و انحراف استاندارد در متغیرهای زیرمقیاس های نشخوار فکری (تمرکز بر خود و ارزیابی منفی)، خصومت

و شفاهی از بیماران، مبانی اصول اخلاقی طبق بیانیه هلسینکی رعایت شد و دارای کد اخلاق به شماره IR.IAU. TMU. REC. 1399. 065 اخذ گردید. طرح پژوهشی توسط روانشناس با تجربه در محیطی آرام و بدون استرس صورت گرفت. به بیماران اطمینان کامل داده شد که اطلاعات درج شده کاملاً محرمانه می‌باشد. گروه کنترل نیز به موازات گروه آزمایش تحت نظارت دقیق قرار داشتند. نحوه انتخاب و اجرای پرسشنامه‌ها در این گروه درست مانند گروه آزمایش بود، اما مهارت آموزی مبتنی بر درمان شفقت به خود، برای گروه کنترل در نظر گرفته نشد. البته در پایان پژوهش با آزمودنی‌های حاضر در گروه کنترل، توافق شد تا در لیست انتظار قرار گیرند و در صورت تمایل پس از خاتمه طرح، در دوره مهارت‌آموزی مبتنی بر درمان شفقت به خود شرکت کنند. پس از اتمام دوره مهارت آموزی، بلافاصله از هر دو گروه در تمامی متغیرها آزمون گرفته شد و همان پرسشنامه‌های مرحله اول دوباره اجرا شد (۲۰).

ملاک‌های ورود، دامنه سنی ۵۵-۲۰ سال، داشتن توانایی جسمانی لازم، سواد و توانایی درک و پاسخگویی به سؤالات (داشتن تحصیلات سیکل و بالاتر)، تمایل به مشارکت در پژوهش، داشتن تشخیص قطعی بیماری HIV و عدم سابقه اختلال حاد روانپزشکی و عدم بستری در طی یکسال گذشته بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مانند محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع و آزمون‌های آماری تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد.

ابزار پژوهش: در تحقیق حاضر و برای گردآوری اطلاعات، از سه پرسشنامه استاندارد شده به شرح زیر استفاده شد.

پرسشنامه نشخوار فکری^۷ RRS: این پرسشنامه توسط تراپنل^۸ و کمپل^۹ (۱۹۹۹) جهت تمایز میان مولفه‌های سازگارانه و ناسازگارانه تهیه شد که شامل دومولفه، تفکرهای مکرر منفی و تامل است. تفکرهای مکرر مرتبط به حالت‌های منفی مانند اضطراب، افسردگی و خشم است. مولفه تامل مرتبط به ارزیابی، تمرکز، باز بودن نسبت به تجربه، کنجکاوای فکری، علاقه ذاتی به تفکر انتزاعی و یا فلسفی است. این پرسشنامه شامل ۲۴ آیتم است ۱۲ آیتم تمرکز و نشخوارفکری بر خود می باشد و ۱۲ آیتم تفکر تاملی و ارزیابی منفی خود است. پاسخ به هر ماده در مقیاس لیکرت درجه بندی شده است. آلفای کرونباخ همسانی درونی خوبی در تامل ۰/۹۱ و در نشخوار فکری ۰/۹۰ نشان داد. واتسون و هارکیس، همسانی درونی را در آمریکا ۰/۸۱ گزارش کردند. قربانی در ایران (با استفاده از آلفای کرونباخ) همسانی درونی ۰/۸۱ گزارش کرد (۲۱).

پرسشنامه خصومت ردفورد^{۱۰} RWHI: این پرسشنامه توسط

۷. Rumination-reflection scale
۸. Trapnell
۹. Campbell
۱۰. Redford -Williams Hostility Inventory

۱۱. Coock
۱۲. Internalized Shame scale

جدول ۱. خلاصه جلسات مهارت آموزی مبتنی بر درمان شفقت به خود (گیلبرت ۲۰۱۰)

جلسه	هدف	محتوای هر جلسه	تکلیف
اول	مفهوم سازی	آشنایی افراد گروه با یکدیگر، مفهوم سازی و تعریف شفقت، معرفی و آشنایی با درمان مبتنی بر شفقت.	
دوم	معرفی سیستم هیجانی	معرفی سه سیستم هیجانی و چگونگی تاثیر آن بر فرد، توضیح تفاوت بین ذهن متمرکز بر تهدید و ذهن مشفق. بررسی سیستم هیجانی فعال در موقعیت رنج آور، آموزش توجه آگاهی برای مثال خوردن کشمش.	آگاهی از موقعیت رنج آور و سیستم هیجانی فعال.
سوم	آشنایی با خصوصیات شفقت و شناخت فرد مشفق	توضیح خصوصیات ششگانه شفقت، شامل حساسیت و مراقبت از خود، بهزیستی، همدلی همدردی، غیر قضاوتی بودن، تحمل آشفتگی، تعریف فرد مشفق و ویژگیهای آن (خردمندی، قدرت، مهربانی، غیر قضاوتی بودن، مسئولیت پذیری). مهارت آموزی جهت یادگیری مشفق بودن.	توجه به نمونه هایی از مولفه های شفقت و فرد مشفق در زندگی.
چهارم	استدلال و توجه مشفقانه	استفاده از ریتم نفسی آرام بخش، آموزش نحوه تصویر سازی خود مشفق، تمرین تصور بهترین حالت خود، اجرای تکنیک صندلی مشفق (باتکنیک سه صندلی) جهت توجه به تفاوت نشخوار فکری و خود مشفق.	تمرین صندلی مشفقانه و مقابله با خود انتقادگر.
پنجم	تصویر سازی و تجربه حسی مشفقانه	معرفی قدرت تصویر سازی برای انسانها و ارتباط آن با سه سیستم هیجانی، تصویر سازی ایجاد مکانی امن، رنگ آمیزی مشفقانه تصویر.	ایجاد تصویرسازی مشفقانه هنگام مواجه با رنج.
ششم	نگارش نامه مشفقانه	نگارش نامه مشفقانه به خود، بدون قضاوت و خشم، بیان احساسات مشفقانه و آگاهانه بدون ترس از شفقت.	تمرین نگارش نامه شفقت برای پذیرش احساسات و افکار خود بدون ترس و قضاوت.
هفتم	کار با صندلی مشفق	تمرکز بر صندلی برای نمایش افکار، احساسات و بخشهای متفاوت فرد (خشم و شفقت) برای به تعادل رسیدن افکار فرد، شناخت خطاهای تفسیری و تاثیر آن، ابزار احساسات مشفقانه توأم با ذهن آگاهی.	تمرین و تولید افکار خودسرزنی، خطاهای تفسیری و ابزار احساسات مشفقانه توأم با آگاهی.
هشتم	تصویر ساز و کاربرد خاطره مهربانی	تمرکز، تصویر سازی خاطره فردی مهربان که احساس مهربانی ایجاد کرده، تصویر سازی احساسات مهربانانه با ارائه مراقبه های لازم جهت تصویر سازی.	تمرین و تصویر سازی خاطره مهربانانه همراه با مراقبه.
نهم	مسئولیت پذیری	آموزش مسئولیت پذیری مولفه اساسی شفقت، ایجاد احساسات ارزشمندی، احترام، برخورد مناسب و کار آمد، بررسی معایب و مزایای افکار و باورهای غیر مفید در مورد حمله به خود.	تمرین مسئولیت پذیری در مورد احساسات و افکار.
دهم	مرور و جمع بندی	خاتمه کار گروه، انجام پس آزمون.	

جدول ۲. ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه

تحصیلات			تعداد فرزندان			وضعیت تاهل		
%	N		%	N		%	N	
۴۸/۳۳	۲۹	زیر دیپلم	۵۱/۶۶	۳۱	۰	۱۰	۳	مجرد
۳۵	۲۱	دیپلم	۳۵	۲۱	۱-۲	۴۰	۲۴	متاهل
۱۶/۶۶	۱۰	دانشگاهی	۱۳/۳۳	۸	≥۳	۵۰	۳۳	بیوه و مطلقه

جدول ۳. نتایج آزمون پیلای، لامبدای ویلکز، اثر هلتنینگ، بزرگترین ریشه روی برای بررسی کل مدل

Observed Power	Sig	Partial Eta	Error df	Hypothesis df	F	Value	آزمون
۰/۸۴	۰/۰۱	۰/۲۲	۵۱/۰۰	۴/۰۰	۳/۶۱	۰/۲۲	اثر پیلای
۰/۸۴	۰/۰۱	۰/۲۲	۵۱/۰۰	۴/۰۰	۳/۶۱	۰/۷۷	لامبدای ویلکز
۰/۸۴	۰/۰۱	۰/۲۲	۵۱/۰۰	۴/۰۰	۳/۶۱	۰/۲۸	اثر هلتنینگ
۰/۸۴	۰/۰۱	۰/۲۲	۵۱/۰۰	۴/۰۰	۵۳/۶۱	۰/۲۸	بزرگترین ریشه روی

با توجه به نمره میانگین های ارائه شده و با توجه به سطح معناداری می توان گفت که مهارت آموزی مبتنی بر درمان شفقت به خود توانسته است میانگین خصومت و شرم را در گروه آزمایش در پس آزمون کاهش دهد.

بحث

بیماری HIV علاوه بر ایجاد مشکل در سلامت جسمی، مشکلات فراوانی برای بیماران در حوزه روانشناختی ایجاد می کند (۲۴). زنان مبتلا به HIV هیجانات منفی متعددی را تجربه می کنند. با توجه به اینکه پژوهشگران کمتر به مشکلات روانشناختی زنان مبتلا به HIV پرداخته اند (۶). پژوهش

و شرم در زنان مبتلا به HIV در پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد.

برای تعیین اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر درمان شفقت به خود بر نشخوار فکری، خصومت و شرم در زنان مبتلا به HIV، در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج در جدول ۵- ارائه شده است. همانطور که جدول نشان می دهد، بین گروه آزمایش و کنترل در میانگین های تعدیل شده از لحاظ متغیرهای وابسته خصومت و شرم تفاوت معنادار مشاهده شد ($p < 0.01$). در رابطه با نشخوار فکری و زیرمقیاس هایش بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد.

جدول ۴. نمرات میانگین، انحراف استاندارد زیر مقیاسهای، نشخوار فکری، خصومت و شرم در به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

میانگین ± انحراف استاندارد		گروه	متغیرها
پس آزمون	پیش آزمون		
۲۵/۵۰ ± ۲/۲۶	۲۷/۰۰ ± ۰/۴۴	آزمایش	نشخوار فکری تمرکز بر خود
۲۶/۷۰ ± ۲/۵۰	۲۷/۴۶ ± ۰/۴۹	کنترل	
۲۴/۵۰ ± ۲/۱۶	۲۶/۲۳ ± ۲/۴۳	آزمایش	نشخوار فکری خود ارزیابی منفی
۲۴/۵۳ ± ۲/۳۸	۲۵/۴۰ ± ۲/۷۳	کنترل	
۵۰/۰۰ ± ۳/۷۶	۵۳/۲۳ ± ۴/۴۵	آزمایش	نمره کل نشخوار فکری
۵۱/۲۳ ± ۳/۹۴	۵۲/۸۶ ± ۴/۴۷	کنترل	
۶/۴۰ ± ۲/۵۴	۷/۵۳ ± ۲/۷۳	آزمایش	خصومت
۷/۳۰ ± ۲/۷۰	۷/۶۳ ± ۲/۹۰	کنترل	
۴۹/۱۳ ± ۹/۷۴	۵۲/۲۶ ± ۱۰/۲۸	آزمایش	شرم
۵۱/۱۰ ± ۱۱/۰۷	۵۲/۰۳ ± ۱۰/۹۹	کنترل	

جدول ۵. نتایج تحلیل کوواریانس، اثر بخشی مهارت آموزی مبتنی بر درمان شفقت به خود بر نشخوار فکری، خصومت و شرم در زنان مبتلا به HIV در دو گروه آزمایش و کنترل

Observed Power	Partial Eta	P	F	MS	Df	SS	متغیر وابسته
۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۰۶	۳/۵۲	۸/۹۱ ۲/۵۳	۱ ۵۴	۸/۹۱ ۱۳۶/۶۶	بین گروهی درون گروهی نشخوار فکری تمرکز بر خود
۰/۰۷	۰/۰۰	۰/۶۳	۰/۲۳	۰/۸۱ ۳/۵۱	۱ ۵۴	۰/۸۱ ۱۸۹/۹۷	بین گروهی درون گروهی نشخوار فکری خود ارزیابی منفی
۰/۳۲	۰/۰۴	۰/۱۳	۲/۳۹	۱۵/۱۳ ۶/۴۴	۱ ۵۴	۱۵/۱۳ ۳۴۷/۹۰	بین گروهی درون گروهی نمره کل نشخوار فکری
۰/۶۷	۰/۱۰	۰/۰۱	۶/۰۴	۱۰/۳۱ ۱/۷۰	۱ ۵۴	۱۰/۳۱ ۹۲/۱۱	بین گروهی درون گروهی خصومت
۰/۷۸	۰/۱۲	۰/۰۰	۷/۸۱	۶۵/۱۱ ۸/۳۲	۱ ۵۴	۶۵/۱۱ ۴۴۹/۷۵	بین گروهی درون گروهی شرم

نتایج پژوهش حاضر می‌باشد (۳۴). در مطالعه حاضر فرض اول پژوهش، مبنی بر اثربخشی مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود بر کاهش نشخوار فکری تایید نگردید. فرضیه های دوم و سوم پژوهش مبنی بر اثر بخش بودن جلسات دهگانه بر کاهش احساس خصومت و شرم در زنان مبتلا به HIV تایید شد.

محدودیت‌های پژوهش

از جمله محدودیت‌های پژوهش می‌توان به جنسیت نمونه اشاره کرد که همگی زن بودند. برخی از پژوهش‌ها نشان داده که زنان شفقت به خود کمتری دارند و تغییر این سازه در زنان به دشواری صورت می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بعدی در هر دو جنس صورت گرفته و مقایسه شوند. ابتلا به بیماری HIV و مشکلات ناشی از بیماری موجب ریزش تعدادی از شرکت کنندگان قبل از شروع پژوهش گردید. با توجه به شرایط سخت جسمانی زنان مبتلا به HIV گاهی فرایند آموزش بسیار دشوار بود. این امر موجب طولانی‌تر و چند مرحله‌ای شدن جلسات می‌شد، اما با تمام مشکلات به دلیل اهمیت پژوهش سعی شد تا حد امکان جلسات در مناسبترین زمان ممکن انجام شود. از دیگر محدودیت‌های پژوهش حاضر، قابل کاربردی بودن آن در جامعه آماری زنان مبتلا به HIV می‌باشد و نمی‌توان نتایج آن را به جامعه آماری دیگر تعمیم داد.

در پایان پیشنهاد می‌شود تا پژوهشگران آتی به پژوهش‌های مشابه در گروه‌های وسیع‌تر و در هر دو جنسیت بپردازند. همچنین مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت مبتنی به خود، به عنوان یک درمان مکمل در کنار دارو درمانی برای بهبود علائم روانشناختی بیماران استفاده شود.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر بیان کننده اثربخشی مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود بر کاهش شرم و خصومت در زنان مبتلا به HIV می‌باشد. لذا در مراحل مختلف درمان می‌توان با انجام این گونه آموزش‌ها و مداخلات مربوطه به بهبود مشکلات روانشناختی، کاهش شرم و خصومت در زنان مبتلا به HIV کمک کرد. مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود می‌تواند بسیاری از مشکلات و هیجانات منفی در زنان مبتلا به HIV را کاهش دهد و توانایی آنها را برای سازگاری با بیماری افزایش دهد.

تشکر و قدردانی

مجریان این طرح از کلیه همکاران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری که در انجام این طرح ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی می‌کنند.

حاضر به منظور تعیین اثربخشی مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود در زنان مبتلا به HIV بر نشخوار فکری، خصومت و شرم انجام شد. تغییرات کسب شده در طی جلسات مداخله مهارت آموزشی در زنان مبتلا به HIV در گروه آزمایش به وضوح مشاهده می‌شد. بیمارانی که به دلیل احساس خصومت و شرم ناشی از بیماری، همکاری لازم جهت درمان را نداشتند، نسبت به خود مشفقانه تر رفتار می‌کردند، بیماری خود را پذیرفته بودند و شفقت به خود را جایگزین هیجانات منفی کرده بودند. برون و همکاران در پژوهشی به بررسی اثربخشی شفقت به خود بر روی بیماران مبتلا به HIV پرداختند و نتایج نشان داد که آموزش شفقت به خود در کاهش مشکلات روانشناختی و افزایش سازگاری در این بیماران موثر است (۲۵). کمالی نسب و محمدخانی در پژوهشی رابطه بین شفقت به خود و سازگاری را تایید کردند (۲۶). نشخوار فکری، یکی از مولفه‌های مهم در اثربخشی مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود می‌باشد. شفقت به خود موجب آگاهی از هیجانات و کاهش نشخوار فکری می‌شود. افرادی که خودتاملی بالایی نسبت به خود دارند نشخوار فکری پایین‌تری را تجربه می‌کنند. اگر نشخوار فکری در حد بالایی باشد، شفقت به خود حتی می‌تواند نشخوار فکری را تشدید کند (۲۷). زنان مبتلا به HIV نسبت به خود، ارزیابی منفی و نشخوار فکری بالایی دارند (۲۸). در پژوهش حاضر زنان مبتلا به HIV به دنبال جلسات مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود و آگاهی از هیجانات خود، به دلیل عدم همخوانی بین شرایط آرمانی و موقعیت فعلی نشخوار فکریشان کاهش نیافت که با پژوهش گیلبرت و پاولی و همکارانش همسو بود (۲۹ و ۲۷). یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های شفقت به خود داشتن احساس مشترک و نگرش مشفقانه نسبت به خود و دیگران است. شفقت ذهن را تلطیف می‌کند و موجب کاهش احساس خصومت می‌گردد (۳۰). چراغی و همکاران در پژوهشی به مقایسه احساس خصومت بین زنان مبتلا به ایدز و غیرمبتلا پرداختند. نتایج نشان داد که زنان مبتلا به ایدز احساس خصومت بیشتری را به دلیل مشکلات جسمی و روانی تجربه می‌کنند (۳۱). نتایج پژوهش حاصل با پژوهش جین و همکاران مبنی بر کاهش احساس خصومت در زنان مبتلا به HIV به دنبال مداخله همخوانی دارد. بر این اساس زنان مبتلا به HIV احساس شرم را تجربه می‌کنند (۳۲). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که جلسات دهگانه مهارت آموزشی مبتنی بر درمان شفقت به خود توانسته احساس شرم را در زنان مبتلا به HIV کاهش دهد. این نتایج با پژوهش ایرون و همکاران که به منظور بررسی شفقت به خود بر کاهش احساس شرم و خود انتقادی در افراد با تجربه‌ی پریشانی پس از سانحه بود، همسو بود (۳۳). سعیدی و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر القای شفقت به خود بر کاهش احساس شرم پرداختند. نتایج نشان داد که شفقت به خود موجب کاهش احساس شرم می‌شود که همراستا با

1. Paudel V, Baral KP. Women living with HIV/AIDS (WLHA), battling stigma, discrimination and denial and the role of support groups as a coping strategy: a review of literature. *Reprod Health* 2015;12:53.
2. Siuki HA, Peyman N, Vahedian-Shahroodi M, Gholian-Aval M, Tehrani H. Health education intervention on HIV/AIDS prevention behaviors among health volunteers in healthcare centers: An applying the theory of planned behavior. *Journal of Social Service Research* 2019;45(4):582-8.
3. Satar P. Women with AIDS lived experience of social relations. *Women in Politics Birth* 2014.
4. Torkashvand F, Asadpor M, SheikhFathollahi M, Sheikhi E, SalehiShahrababaki MH, RezaHoseini O, et al. Frequency of High Risk Behaviour in HIV Positive Patients Referred to Centers for Behavioural Disorders of Rafsanjan and Kerman in 2012. *Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences* 2015;14(7):587-98.
5. Salimi A, Arsalandeh F, Zaharakar K, Davarniya R, Shakarami M. The effectiveness of compassion-focused therapy on mental health of women with multiple sclerosis. *The Horizon of Medical Sciences* 2018;24(2):125-31.
6. Moseholm E, Weis N. Women living with HIV in high-income settings and breastfeeding. *J Intern Med* 2020;287(1):19-31.
7. Robinson MS, Alloy LB. Negative cognitive styles and stress-reactive rumination interact to predict depression: A prospective study. *Cognitive Therapy and Research* 2003;27(3):275-91.
8. Masoudnia E. Hostility, anger and risk of coronary artery atherosclerosis. *Journal of Shahid Sadoughi University Of Medical Sciences And Health Services* 2011; 18(6): 540-1.
9. Manstead AS. *Social psychology of emotion*. Oxford University Press: New York, NY, USA. 2010.
10. Gh R, Abbasi GH. Investigation relationship between self criticism, social anxiety and fear of fail with same among students. *Journal of Research Clinical Psychology and Consultation* 2011;1:171-82.
11. Neff KD, Kirkpatrick KL, Rude SS. Self-compassion and adaptive psychological functioning. *Journal of Research in Personality* 2007;41(1):139-54.
12. Neff KD, Germer CK. A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program. *J Clin Psychol* 2013;69(1):28-44.
13. Neff KD. The development and validation of a scale to measure self-compassion. *Self and Identity* 2003;2(3):223-50.
14. Homan KJ. Self-compassion and psychological well-being in older adults. *Journal of Adult Development* 2016;23(2):111-9.
15. Bistricky SL, Gallagher MW, Roberts CM, Ferris L, Gonzalez AJ, Wetterneck CT. Frequency of interpersonal trauma types, avoidant attachment, self-compassion, and interpersonal competence: A model of persisting posttraumatic symptoms. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 2017;26(6):608-25.
16. Shonin E, Van Gordon W, Griffiths MD. The psychotherapeutic applications of loving-kindness and compassion meditation. 2014.
17. Raab K. Mindfulness, self-compassion, and empathy among health care professionals: a review of the literature. *J Health Care Chaplain* 2014;20(3):95-108.
18. Bluth K, Gaylord SA, Campo RA, Mullarkey MC, Hobbs L. Making Friends With Yourself: A Mixed Methods Pilot Study of a Mindful Self-Compassion Program for Adolescents. *Mindfulness (NY)* 2016;7(2):479-492.
19. Pu H, Hernandez T, Sadeghi J, Cervia JS. Systematic review of cognitive behavior therapy to improve mental health of women living with HIV. *J Investig Med* 2020;68(1):30-36.
20. Hooman H. *Understanding the scientific method in behavioral science* Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities. Tehran P Samt 2006.
21. Ghorbani N, Watson PJ, Weathington BL. Mindfulness in Iran and the United States: Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with psychological adjustment. *Current Psychology* 2009;28(4):211.
22. Shokoochi YM, Akbari ZS, Shahmohammadi K. The Effects of Using Problem Solving and Anger Management Package on Mental Health and Teaching Style of Preschool Teachers. *Journal of School Psychology* 2014; 2(4): 98-117.
23. Rajabi Gh, Abbasi GH. [Investigation relationship between self criticism, social anxiety and fear of fail with same among students]. *Journal of research clinical psychology and consultation* 2011; 1:171-82. (Persian)
24. Avanesian E, Naserirad M, Abrahamian H, Anis S. Size of Social Network and Probability of Occurrence of HIV/AIDS among Sexually Affected Patients in Behavioral Diseases Consulting Centers. *Iranian Journal of Health Education and Health Promotion* 2017;5(2):73-80.
25. Brion JM, Leary MR, Drabkin AS. Self-compassion and reactions to serious illness: the case of HIV. *J Health Psychol* 2014;19(2):218-29.
26. Kamalinasab Z, Mohammadkhani P. A comparison of self-compassion and self-esteem based on their relationship with adaptive and maladaptive emotion regulation strategies. *Practice in Clinical Psychology* 2018;6(1):9-20.
27. Gilbert P, editor. *Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy*. Routledge; 2005.
28. Travaglini LE, Himelhoch SS, Fang LJ. HIV Stigma and Its Relation to Mental, Physical and Social Health Among Black Women Living with HIV/AIDS. *AIDS Behav* 2018;22(12):3783-3794.
29. Pauley G, McPherson S. The experience and meaning of compassion and self-compassion for individuals with depression or anxiety. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice* 2010;83(2):129-43.
30. Lutz A, Brefczynski-Lewis J, Johnstone T, Davidson RJ. Regulation of the neural circuitry of emotion by compassion meditation: effects of meditative expertise. *PLoS One* 2008;3(3):e1897.
31. Gharaghi A, Esmaeilinasab, M, Rassoolzadeh Tabatabaee SK. Comparison of feelings of hostility in women with and without AIDS. *Journal of Research in Psychological Health* 2016; 9(4): 32-45.
32. JIN G, LI D. The effects of loving-kindness and compassion meditation on altruistic behavior and its cognitive neural mechanisms. *Advances in Psychological Science* 2020;28(6):978-86.
33. Irons C, Lad S. Using compassion focused therapy to work with shame and self-criticism in complex trauma. *Australian Clinical Psychologist* 2017;3(1):1743.
34. Saeedi Z, Ghorbani N, Sarafranz MR, Sharifian MH. The effect of inducing self-compassion and self-esteem on the level of the experience of shame and guilt. *Contemporary Psychology* 2013; 8(1): 91-102.