

● مقاله تحقیقی کد مقاله: ۰



بررسی اثر هپاتیت B و C بر آنمی در بیماران همودیالیزی

چکیده

زمینه: عفونت هپاتیت B و C بطور شایع در بیماران دیالیزی دیده می شوند، اما اثرات طولانی مدت آنها در این بیماران ناشناخته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر هپاتیت B و C بر روی آنمی در بیماران همودیالیزی می باشد.

روش کار: این مطالعه تحلیلی بر روی ۹۰ بیمار همودیالیزی مبتلا به آنمی بخش همودیالیز بیمارستانهای کامکار و حضرت ولیعصر (عج) استان قم انجام شد. بیماران شامل تمام همودیالیزی های مبتلا به هپاتیت B (۱۱ نفر) و C (۱۹ نفر)، و ۶۰ بیمار تحت همودیالیز هپاتیت منفی بودند. بیماران بمدت سه ماه تحت درمان با اریتروپویتین قرار گرفته و هموگلوبین و هماتوکریت قبل و به صورت ماهانه تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون T، Anova، Scheffe، و فیشر استفاده شد.

یافته ها: میانگین افزایش هموگلوبین و هماتوکریت در گروه هپاتیت منفی، هپاتیت C و B بترتیب برابر $1/45 \pm 1/50$ و $1/40 \pm 5/10$ ، $2/88 \pm 1/40$ ، $2/56 \pm 2/75$ و $7/56 \pm 1/17$ ، $1/86 \pm 1/11$ و $5/73 \pm 4/11$ g/dL بود. میانگین افزایش هموگلوبین و هماتوکریت در گروه هپاتیت C بیشتر از گروه هپاتیت منفی بوده و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. هرچند میانگین افزایش هموگلوبین و هماتوکریت در گروه هپاتیت B بیشتر از گروه هپاتیت منفی بوده است اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری: هپاتیت C با افزایش سطح هموگلوبین و هماتوکریت بدنیال درمان با اریتروپویتین مرتبط بود.

واژه گان کلیدی: هپاتیت C، هپاتیت B، همودیالیز، آنمی

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۱۰/۱۵

تاریخ اصلاح نهایی: ۸۷/۵/۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۷/۷/۲۳

دکتر محمد رضا قدیری ۱

دکتر سید مجید موسوی موحد ۲*

دکتر احمد کمیلی موحد ۳

طاهره کمیلی موحد ۴

دکتر اکرم حیدری ۵

۱. استادیار، فوق تخصص گوارش،

دانشگاه علوم پزشکی قم

۲. استادیار فوق تخصص نفرولوژی،

دانشگاه علوم پزشکی قم

۳. پزشک عمومی، دانشگاه علوم

پزشکی قم

۴. کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه

علوم پزشکی قم

۵. دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی،

دانشگاه علوم پزشکی قم

*تشانی نویسنده مسئول: قم - خیابان

ساحلی دانشگاه علوم پزشکی

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۳۵۲۲۳

دورنگار: ۰۲۵۱-۲۹۰۹۲۸۸

نشانی الکترونیکی:

Moosavy_sm@yahoo.com

مقدمه

بیماران همودیالیزی بوده‌اند [۱۲] و شیوع آنتی بادی ضد HCV در میان بیماران دیالیزی بالاتر از مردم عادی است. شیوع این عفونت در کشورها و حتی مراکز مختلف دیالیز، متفاوت است، بطوروی که در یک مطالعه برروی ۶۱۴۰۰ بیمار دیالیزی در ایالات متحده آمریکا، این میزان در محدوده ۰٪ تا ۶۴٪ قرار داشت [۱۳]. این میزان در آسیا بین ۲۲٪ تا ۵۵٪ ذکر شده است [۱۴، ۱۵]. البته میزان شیوع و بروز هپاتیت C بطور پیوسته در حال کاهش است. برای مثال، این میزان در مراکز دیالیز اروپا از ۲۱٪ در سال ۱۹۹۲ به ۱۷٪ در سال ۱۹۹۹ رسیده است [۱۶-۱۸]. شیوع HCV Ab مثبت در بیماران همودیالیزی ایران، از ۱۴٪ در سال ۱۹۹۹ به ۴٪ در سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است [۱۹]. این کاهش به افزایش میزان آگاهی، استفاده از روش‌های تشخیصی بهتر برروی فرآورده‌های خونی و کنترل مناسب تر عفونت در مراکز دیالیز مربوط می‌شود [۲۰، ۲۱، ۲۲]. اگرچه، انتقال هپاتیت C از طریق دستگاه‌های آلوده در بخش‌های دیالیز و دریافت خون آلوده هنوز خطر مهمی برای عفونت محسوب می‌شود [۲۰، ۲۳-۲۶]. استفاده از اریتروپویتین برای درمان آنمی هم که نیاز به تزریق خون را کاهش می‌دهد، نقش ترانسفوزیون در انتقال HCV را کاهش داده است. در گذشته هپاتیت B، علت اصلی عفونت‌های ویروسی در بیماران مبتلا به مرحله پایانی بیماری کلیوی بود [۲۷]. البته با استفاده از روش‌های استریل و واکسیناسیون، این میزان کاهش یافته است [۲۸]، بصورتی که میزان بروز موارد جدید هپاتیت B در ایالات متحده آمریکا از ۳٪ در سال ۱۹۷۶ به ۰.۰۶٪ در سال ۱۹۹۵ رسیده است [۱۳]. شیوع HBs Ag مثبت در بیماران همودیالیزی ایران هم، از ۳/۸٪ در سال ۱۹۹۹ به ۲/۶٪ در سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است [۱۹]. اخیراً در تعدادی از گزارشات مشاهده شده است که سطح هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران همودیالیزی هپاتیت C مثبت در مقایسه با هپاتیت منفی بالاتر می‌باشد [۲۹-۳۱]. به هر حال اطلاعات در مورد اثر عفونت هپاتیت برروی سطح هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران همودیالیزی مورد بحث می‌باشد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر هپاتیت B و C برروی میزان بهبود آنمی در بیماران همودیالیزی تحت درمان با اریتروپویتین بوده است.

روش بررسی

این مطالعه یک مطالعه تحلیلی بود که در سال ۱۳۸۷ در بخش همودیالیز بیمارستانهای کامکار- عرب نیا و حضرت ولی‌عصر (عج) 1-Glomerular Filtration Rate

تعریف سازمان جهانی بهداشت از آنمی عبارت از غلظت هموگلوبین کمتر از ۱۳ gr/dl در مردان بالغ و زنان یائسه و غلظت هموگلوبین زیر ۱۲ gr/dl در زنان بیش از یائسگی است [۱]. بر این اساس، نزدیک ۹۰٪ از بیماران با GFR کمتر از ۲۵-۳۰ ml/min دچار آنمی هستند که تعداد زیادی از آنها هموگلوبین کمتر از ۱۰ gr/dl دارند [۲]. آنمی به عنوان یکی از عوامل دخیل در بسیاری از علائم مرتبط با کاهش عملکرد کلیه نقش دارد. این علائم شامل خستگی، افسردگی، کاهش توانایی تحرک، تنگی نفس و عوارض قلبی-عروقی از قبیل هیپرتروفی بطن چپ و اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ می‌باشد [۳]. این شرایط موجب افزایش قابل توجه عوارض بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی-عروقی در بیماران دیالیزی می‌شود [۴-۷]. برای مثال در مطالعه انجام شده بر روی ۵۰ تا ۷۵ هزار بیمار همودیالیزی گزارش شده است که در بیماران با سطح هماتوکریت کمتر از محدوده ۳۳-۳۶٪، خطر مرگ و میر ناشی از عوارض قلبی افزایش پیشرونده‌ای دارد [۸].

آنمی ناشی از نارسایی مزمن کلیوی در اغلب موارد نورموسیتیک و نورموکرومیک بوده و ناشی از کاهش تولید اریتروپویتین کلیوی می‌باشد [۹]. کلیه‌ها محل اولیه تولید اریتروپویتین در بزرگسالان هستند و کبد تنها مشارکت جزئی در این امر دارد [۹، ۱۰]. ترجیح اریتروپویتین از طریق مکانیسم فیدبک و اکسیژناسیون بافتی تنظیم می‌شود. مصرف اریتروپویتین، آنمی را به عنوان یکی از علل عدمه مرگ و FDA میر در بین بیماران دیالیزی رفع نموده است. بعد از تأیید اریتروپویتین انسانی صناعی به عنوان درمان استاندارد آنمی ناشی از کمبود اریتروپویتین که در بیشتر موارد بیماری‌های مزمن کلیوی دیده می‌شوند، معرفی گردید. بیش از ۹۰٪ بیماران آمریکایی که تحت همودیالیز مزمن قرار دارند، اریتروپویتین دریافت می‌کنند [۱۱]. اریتروپویتین در بیماران همودیالیزی که سطح هموگلوبین کمتر از ۱۱ gr/dl دراند تجویز می‌شود. تا زمانی که ذخایر آهن مورد بررسی قرار نگرفته است، نباید تجویز اریتروپویتین را شروع نمود. در بیماران با شواهد کمبود آهن (غلظت فریتین سرم کمتر از ۱۰۰ ml/mg و درصد اشباع کمتر از ۲۰٪) باید ابتدا ذخایر آهن جبران شود. قبل از تجویز اریتروپویتین باید سایر علل آنمی رد شده و هیپرتانسیون اصلاح شود.

هپاتیت B و C مهمترین عفونت‌های منتقل شونده از طریق غیرروهه‌ای در بیماران تحت همودیالیز هستند. هپاتیت C از زمان تشخیص در سال ۱۹۸۹، از مهمترین عفونتهای ویروسی در میان



با انجام تست Anova و تست تعقیبی Scheffe هماتوکریت در بیماران مبتلا به هپاتیت C نسبت به بیماران بدون هپاتیت بیشتر بود و این اختلاف آماری معنی دار بود ($P = 0.01$) (جدول شماره ۲).

با انجام تست T میانگین افزایش هموگلوبین در مردان همودیالیزی هپاتیت منفی بیشتر از زنان این گروه بود اما بین جنس و افزایش هموگلوبین در این گروه اختلاف معنی داری یافت نشد ($Pvalue = 0.07$) (جدول شماره ۳).

با انجام تست T میانگین افزایش هموگلوبین در زنان همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C و B بیشتر از مردان این گروه ها بود اما بین جنس و افزایش هموگلوبین در این گروه ها اختلاف معنی داری یافت نشد (ترتیب هپاتیت C و B برابر $Pvalue = 0.624$ و $Pvalue = 0.943$) (جدول شماره ۳).

بحث

مبτالیان به مرحله پایانی بیماری کلیوی که تحت همودیالیز قرار دارند، معمولاً به علت کمبود ترشح اریتروپویوتین از کلیه ها دچار آنمی می شوند. تولید RBC به وجود اریتروپویوتین و ذخایر کافی آهن نیاز دارد، و اریتروپویوتین هورمون اصلی تکثیر RBC در مغز استخوان است. این هورمون بلوغ بلاست های اطراف توپولی در محل اصلی تولید اریتروپویوتین، فیبروبلاست های اطراف توپولی در کلیه است. درجات کمی از تولید اریتروپویوتین اندوژن هم در کبد صورت می گیرد [۳۲]. این مطلب در مطالعاتی که بر روی جنین و حیواناتی که تحت نفروکتومی قرار گرفته اند، مشخص شده است. محل دقیق تولید اریتروپویوتین در کبد مشخص نیست. تعدادی از مطالعات این عمل را به سلولهای کوپفر نسبت داده اند [۳۳]، در حالی که تعدادی دیگر معتقدند که این عمل در هپاتوسیت های اطراف ورید مرکزی صورت می گیرد [۳۴]. در هر حال، هپاتونکروز بدنبال التهاب و یا هپاتیت می تواند موجب رها شدن اریتروپویوتین از هپاتوسیت ها و ورود آنها به گردش خون شود.

نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین افزایش هموگلوبین و هماتوکریت پس از یک دوره درمان سه ماهه با اریتروپویوتین در گروه هپاتیت C به صورت معنی داری بیشتر از گروه هپاتیت منفی بود که این نتیجه با سه مطالعه دیگری هم که در ایالات متحده آمریکا، تایوان و چین انجام گرفته است، مطابقت دارد. در مطالعه ای که توسط Khurana و همکاران در تگزاس انجام گرفته، مبتالیان به هپاتیت C نسبت به گروه شاهد هموگلوبین بالاتری داشته و نیاز

استان قم، بر روی ۹۰ بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز دائمی که دچار آنمی بودند، انجام شد. در این مطالعه ۱۱ نفر از بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت B، ۱۹ نفر مبتلا به هپاتیت C و ۶۰ بیمار همودیالیزی، هپاتیت منفی (بدون سابقه ابتلا به هپاتیت B و C) بودند. معیار انتخاب بیماران از نظر هپاتیت B و C بترتیب بر اساس HCV Ab و HBs Ag مثبت و از نظر آنمی، وجود غلظت هموگلوبین کمتر از ۱۰ gr/dl بود. سپس بیماران از نظر ذخایر آهن مورد بررسی قرار گرفتند. در بیماران با شواهد کمبود آهن (غلظت فربینن سرم کمتر از ۱۰۰ ml/mg درصد اشباع کمتر از ۲۰٪)، ابتدا ذخایر آهن جبران شده بود. قبل از تجویز اریتروپویوتین، سایر علل آنمی رد شده و هیپرتانسیون اصلاح گردید. سپس اریتروپویوتین صناعی به میزان ۲۰۰۰ واحد سه بار در هفته برای مدت سه ماه به صورت زیر جلدی برای بیماران تجویز می گردید. میزان هموگلوبین و هماتوکریت بیماران قبل از تجویز دارو و در طول سه ماه به صورت ماهانه اندازه گیری شد. سایر اطلاعات شامل اسم، سن، جنس و بیماری زمینه ای از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون T Scheffe، Anova و آزمون SPSS استفاده شد.

یافته ها

در این مطالعه از ۹۰ بیمار تحت همودیالیز مبتلا به آنمی، ۳۰ نفر از بیماران مبتلا به هپاتیت (۱۹ نفر هپاتیت C و ۱۱ نفر هپاتیت B) بوده و ۶۰ نفر هپاتیت منفی بودند. میانگین سن بیماران گروه هپاتیت منفی $50/0.6$ ، هپاتیت C $49/73$ و هپاتیت B $53/54$ سال بود. در جدول ۱ اطلاعات آماری بیماران از نظر جنس، سن و بیماری زمینه ای نشان داده شده است.

از نظر سن با انجام تست Anova اختلاف معنی داری بین گروه ها یافت نشد ($P = 0.77$). از نظر جنس با انجام تست فیشر، بین گروه مبتلا به هپاتیت B و بدون هپاتیت منفی ($P = 0.24$) در گروه مبتلا به هپاتیت C و بدون هپاتیت هم با انجام تست فیشر از نظر جنس اختلاف معنی داری ندارند ($P = 0.46$).

با انجام تست Scheffe و تست تعقیبی Anova، افزایش هموگلوبین در بیماران مبتلا به هپاتیت C نسبت به بیماران بدون هپاتیت بیشتر بود و این اختلاف آماری معنی دار بود ($P = 0.02$) (جدول شماره ۲).

در زمینه ارتباط جنس و آنمی در این بیماران صورت گیرد، ثانیا باید با کنترل دقیق تر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت، دوز اریتروپویتین تجویزی در هر گروه را تنظیم کرده و از تجویز روتین آن اجتناب نمود.

نتیجه گیری

در این مطالعه ابتلا به هپاتیت C با افزایش هموگلوبین و هماتوکریت مرتبط بوده و هپاتیت C به عنوان یک عامل بهبودی آنمی در بیماران تحت درمان با اریتروپویتین شناخته شد.

با توجه به نتایج مشابه چندین مطالعه دیگری که در سایر کشورها انجام شده است، می‌توان با کنترل دقیق سطوح هموگلوبین بیماران مبتلا به هپاتیت، از دوز اریتروپویتین این بیماران کاست و تجویز دارو را به صورت روتین انجام نداد. تنظیم دوز تجویزی اریتروپویتین صناعی می‌تواند از هزینه های اضافی در این بیماران جلوگیری نماید.

همچنین تفسیر احتمالی یافته های فوق ممکن است با رها شدن کبدی اریتروپویتین، ثانویه به التهاب مزمن کبدی در اثر هپاتیت مرتبط باشد. البته برای اثبات این مطلب نیاز به مطالعات بیشتر است.

کمتری به اریتروپویتین داشتند [۲۹]. در مطالعه Lin و Chih-Bin Chen با لاتر همکاران در تایوان، هموگلوبین و هماتوکریت گروه هپاتیت C با سطوح بالاتر مرتبه بود اما در هپاتیت B این ارتباط وجود نداشت [۳۱]. در مطالعه ما هم هرچند میانگین افزایش هموگلوبین و هماتوکریت در گروه مبتلايان به هپاتیت B بیشتر از گروه هپاتیت منفی بوده است اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود، با این وجود به نظر می‌رسد در این مورد نیاز به مطالعات بیشتری می‌باشد.

در این مطالعه میانگین افزایش هموگلوبین در مردان همودیالیزی هپاتیت منفی بیشتر از زنان همان گروه بود. ولی در گروه بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C و B میانگین افزایش هموگلوبین در زنان بیشتر از مردان بود، اما اختلاف آماری معنی داری در این دو مورد یافت نشد. با توجه به این مطلب اولاً باید مطالعات بیشتری در زمینه ارتباط جنس و آنمی در این بیماران صورت گیرد، ثانیا باید با کنترل دقیق تر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت، دوز اریتروپویتین تجویزی در هر گروه را تنظیم کرده و از تجویز روتین آن اجتناب نمود.



| جدول شماره ۱: اطلاعات آماری بیماران تحت مطالعه | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|--|
| هپاتیت B | هپاتیت C | هپاتیت منفی | | | |
| (٪ ۶۳/۶) ۷ | (٪ ۴۲/۱) ۸ | (٪ ۴۶/۷) ۲۸ | مرد | جنس | |
| (٪ ۳۶/۴) ۴ | (٪ ۵۷/۹) ۱۱ | (٪ ۵۳/۳) ۳۲ | زن | | |
| (٪ ۲۷/۳) ۳ | (٪ ۱۰/۵) ۲ | (٪ ۳۰) ۱۸ | دیابت | | |
| (٪ ۲۷/۳) ۳ | (٪ ۲۶/۳) ۵ | (٪ ۳۰) ۱۸ | هیپرتانسیون | بیماری زمینه ای | |
| (٪ ۰) ۰ | (٪ ۰۵/۳) ۱ | (٪ ۱۱/۷) ۷ | دیابت و هیپرتانسیون همزمان | | |
| (٪ ۴۵/۵) ۵ | (٪ ۵۷/۹) ۱۱ | (٪ ۲۸/۳) ۱۷ | غیره | | |
| ۵۳/۵۴ | ۴۹/۷۳ | ۵۰/۰۶ | میانگین سن | | |

| جدول شماره ۲: میانگین افزایش هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران همودیالیزی | | |
|--|----------------|-------------|
| هماتوکریت | هموگلوبین g/dL | |
| ۳/۸۸ ± ۵/۰۱ | ۱/۵۰ ± ۱/۴۵ | هپاتیت منفی |
| ۷/۵۶ ± ۳/۷۵ | ۲/۵۶ ± ۱/۴۰ | هپاتیت C |
| ۵/۷۳ ± ۴/۱۱ | ۱/۸۶ ± ۱/۱۷ | هپاتیت B |

| جدول شماره ۳: میانگین افزایش هموگلوبین در بیماران همودیالیزی به تفکیک جنس | | |
|---|---------------|-------------|
| زن | مرد | |
| ۱/۱۸۷ ± ۱/۴۸۷ | ۱/۸۶۷ ± ۱/۳۴۸ | هپاتیت منفی |
| ۲/۷۰۹ ± ۱/۵۲۰ | ۲/۳۷۵ ± ۱/۳۱۱ | C هپاتیت |
| ۱/۹۰ ± ۰/۹۹۳ | ۱/۸۴۲ ± ۱/۳۴۰ | B هپاتیت |

مراجع

- 1- World Health Organization. *Nutritional Anemias: Report of a WHO Scientific Group*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1968.
- 2- Kazmi, WH, Kausz, AT, Khan, S, et al. Anemia: an early complication of chronic renal insufficiency. *Am J Kidney Dis* 2001; 38:803.
- 3- Levin, A, Thompson, CR, Ethier, J, et al. Left ventricular mass index increase in early renal disease: impact of decline in hemoglobin. *Am J Kidney Dis* 1999; 34:125.
- 4- Jurkovitz, CT, Abramson, JL, Vaccarino, LV, et al. Association of high serum creatinine and anemia increases the risk of coronary events: results from the prospective community-based atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. *J Am Soc Nephrol* 2003; 14:2919.
- 5- Abramson, JL, Jurkovitz, CT, Vaccarino, V, et al. Chronic kidney disease, anemia, and incident stroke in a middle-aged, community-based population: the ARIC Study. *Kidney Int* 2003; 64:610.
- 6- Sarnak, MJ, Tighiouart, H, Manjunath, G, et al. Anemia as a risk factor for cardiovascular disease in The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *J Am Coll Cardiol* 2002; 40:27.
- 7- McClellan, WM, Flanders, WD, Langston, RD, et al. Anemia and renal insufficiency are independent risk factors for death among patients with congestive heart failure admitted to community hospitals: a population-based study. *J Am Soc Nephrol* 2002; 13:1928.
- 8- Ma, JZ, Ebbin, J, Xia, H, Collins, AJ. Hematocrit level and associated mortality in hemodialysis patients. *J Am Soc Nephrol* 1999; 10:610.
- 9- Eschbach, JW. Erythropoietin 1991--an overview. *Am J Kidney Dis* 1991; 18:3.
- 10- Ratcliffe, PJ, Ebert, BL, Ferguson, DJ, et al. Regulation of the erythropoietin gene. *Nephrol Dial Transplant* 1995; 10 Suppl 2:18.
- 11- 2004 Annual Report: ESRD Clinical Performance Measures Project. *Am J Kidney Dis* 2005; 46(Suppl 2):S1.
- 12- Kuo G, Choo QL, Alter HJ, et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-A, non-B hepatitis. *Science*. 1989; 244:362-364.
- 13- Tokars, J, Miller, ER, Alter, MJ, Arduino, M. National surveillance of hemodialysis associated diseases in the United States, 1995. *ASAIO J* 1998; 44:98.
- 14- Pereira, BJG, Levey, AS. Hepatitis C virus infection in dialysis and renal transplantation. *Kidney Int* 1997; 51:981.
- 15- Natov, SN, Pereira, BJ. Hepatitis C in dialysis patients. *Adv Ren Replace Ther* 1996; 3:275.
- 16- Geerlings, W, Tufveson, G, Ehrlich, JH, et al. Report on management of renal failure in Europe, XXIII. *Nephrol Dial Transplant* 1994; 9 Suppl 1:6.
- 17- Valderrábano, F, Jones, EHP, Mallick, NP. Report on management of renal failure in Europe, XXIV, 1993. *Nephrol Dial Transplant* 1995; 10(Suppl 5):1.
- 18- Jadoul, M, Poignet, JL, Geddes, C, et al. The changing epidemiology of hepatitis C virus (HCV) infection in hemodialysis: European multicentre study. *Nephrol Dial Transplant* 2004; 19:904.
- 19- Alavian SM, Bagheri-Lankarani K, et al. Hepatitis B and C in dialysis units in Iran: Changing the epidemiology, *Hemodial Int.* 2008 Jul;12(3):378-82
- 20- Almroth G, Ekero B, Mansson A, Svensson G, Widell J. Detection and prevention of hepatitis C in dialysis patients and renal transplant patients. *Journal of Internal Medicine* 2002; 251:119-128.
- 21- Harmankaya O, Cetin B, Obek A, Seber E. Low prevalence of hepatitis C infection in hemodialysis patients. *Ren Fail* 2002; 24(5):639-644.
- 22- Fabrizi F, Poordad F, Martin P. Hepatitis C infection and the patient with end stage renal disease. *Hepatology* 2002; 36(1):3-10.

- 23- JHA V, Chugh S, Chugh K. *Infections in dialysis and transplant patients in tropical patients.* Kidney International 2000;57: s-85-s-93.
- 24- Morduchowicz G, Pttlik SD, Shapira Z, Shmueli D, Yussim A, Djaloyksi S, et al. *infections in renal transplant recipients in Israel.* Isr J Med Sci 1985; 21:791-797.
- 25- Sidabutar RP, Sumardjono S. *Infection in kidney transplantation recipients in Indonesia.* Transplant Proc 1992; 24:1934.
- 26- Gueco I, Saniel M, Mendoza M, Alano F, Ona E. *Tropical infections after renal transplantation.* Transplant Proc 1989;21:2105-2103.
- 27- Tokars, J, Alter, MJ, Favero, MS, et al. *National surveillance of hemodialysis associated diseases in the United States, 1990.* ASAIO J 1993; 39:71.
- 28- Alter, MJ, Favero, MS, Maynard, JE. *Impact of infection control strategies on the incidence of dialysisassociated hepatitis in the United States.* J Infect Dis 1986; 153:1149
- 29-Khurana A, Nickel AE, et al, *Effect of hepatitis C infection on anemia in hemodialysis patients,* Hemodial Int. 2008 Jan;12(1):94-9.
- 30-Lin YL, Lin CW, Lee CH, et al, *Chronic hepatitis ameliorates anemia in hemodialysis patients,* Nephrology (Carlton). 2008 Jun;13(4):289-93. Epub 2008 Mar 5
- 31-Chih-Bin Chen, Che-Yi Chou, MD et aHuang, et al, *Chronic Hepatitis C Infection Is Associated with Higher Hemoglobin Levels in Hemodialysis Patients, But Hepatitis B Infection Is Not,* Dialysis & Transplantation, Volume 37 Issue 1, Pages 12 - 17
- 32-Simon P, Meyrier A, Tanquerel T, Ang KS. *Improvement of anemia in hemodialysed patients after viral or toxic hepatic cytolysis.* Br Med J. 1980; 280:892-894.
- 33-Gordon AS, Naughton BA. *Mechanisms of extrarenal EPO (Ep) production.* Exp Hematol. 1980; 8 (Suppl 8):14-28.
- 34-Eckardt KU. *Erythropoietin production in liver and kidneys.* Curr Opin Nephrol Hypertens. 1996; 5:28-34.