

بررسی آنتی بیوگرام‌های ۲۷۹ سوش استافیلوکوک پاتوژن

در مشهد

مجله نظام پزشکی

سال سوم، شماره ۶، صفحه ۴۸۶، ۱۳۵۲

دکتر طاهره سازگار - دکتر محمد ناظم*

مختصری از خصوصیات استافیلوکوک:

میکروب‌های گرد گرم مثبتی هستند با اندازه ۰/۸ تا یک میکرون که به شکل خوشه انگور اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

بر روی محیط‌های مختلف کشت پس از ۱۸ تا ۲۴ ساعت در شرایط هوازی و بی‌هوازی پرورش می‌یابند. حرارت مناسب رشد ۳۷ درجه است.

بر روی محیط‌های کشت جامد پرگنه‌های آن برنگ‌های طلایی، لیمویی و سفید ممکنست درآید.

بطوریکه گفته شد استافیلوکوک‌ها انواع پاتوژن (بیماریزا) و ساپروفیت دارند و قرار دادن میکروب در یکی از این دو دسته منوط به دارا بودن صفات چندیست که بطور خلاصه عبارتند از:

۱- رنگدانه - اکثر استافیلوکوک‌هایی که از عفونت‌های گوناگون حاصله از این میکروب جدا می‌شوند پرگنه‌شان در محیط جامد برنگ زرد طلایی در می‌آید و پرگنه میکروب‌های ساپروفیت غالباً برنگ سفید یا لیمویی است، بنابراین وجود پرگنه طلایی رنگ استافیلوکوک معمولاً یکی از ضوابطی است که دلالت بر بیماریزا بودن میکروب می‌کند ولی باید در نظر داشت که گاهی استافیلوکوک‌های سفید نیز می‌توانند پاتوژن باشند. از طرفی میکروب در اثر پیری یا کمبود اکسیژن محیط کشت و روی کاغذهای مکرر و عوامل دیگر خاصیت پیگمان زائی خود را از دست می‌دهد. بدین جهت رنگ پرگنه، کافی برای تشخیص کردن استافیلوکوک پاتوژن و بیماریزا نیست.

۲- وجود همولیزین‌ها:

همولیزین آلفا- این همولیزین که از مواد پروتئینی ترکیب یافته

مقدمه: استافیلوکوک میکروبی است که در طبیعت فراوان بوده و نزد انسان و حیوانات باعث پیدایش کانون‌های عفونی مختلف و عفونت‌های عمومی و مسمومیت‌های غذایی می‌گردد.

و خامت عفونت‌های استافیلوکوکی بیشتر مربوط به کسب مقاومت این میکروب در برابر آنتی‌بیوتیک‌هاست، بدین جهت بررسی نحوه انتشار میکروب و ایجاد ضایعات و پایداری روزافزون آن اهمیت شایانی دارد.

از زمان پاستور می‌دانستند که استافیلوکوک در طبیعت انتشار فراوانی داشته و روی پوست و مخاط انسان و حیوانات یافت می‌شود و نه تنها می‌تواند در ایجاد عفونت‌های مختلف شرکت کند بلکه در حفرات طبیعی بدن افراد سالم نیز ممکنست وجود داشته و پرورش یابد. بدین جهت از همان زمان متوجه شده بودند که استافیلوکوک دارای انواع ناخوشی‌زا و ساپروفیت است و اهمیت موضوع در این بود که ضوابط مشخص و روش‌هایی تعیین شود که بتوانند این دو نوع را از هم متمایز و جدا سازند.

پس از کشف آنتی‌بیوتیک‌ها و مصرف روزافزون آنها بویژه در عفونت‌های استافیلوکوکی، متوجه شدند که این میکروب با گذشت زمان حساسیت نسبی خود را در برابر مواد مذکور از دست می‌دهد و همین مطلب موضوع مورد بحث ما را تشکیل می‌دهد.

آنچه در این مقاله مورد توجه ما قرار گرفته نتیجه بررسی حساسیت

۲۷۹ سوش استافیلوکوک ناخوشی‌زا می‌باشد که از بیماران بستری در بیمارستان شاهرزای مشهد، در عرض ۳۶ ماه در آزمایشگاه میکروب‌شناسی جدا و مورد مطالعه و آنتی‌بیوگرام قرار گرفته است.

* مشهد - دانشکده پزشکی، دانشگاه مشهد.

از کشت خون بیماری با حالت وخیم جدا میشود (البته بشرطیکه کشت در شرایط کاملاً دقیق انجام شده باشد) مسلماً پاتوژن میباشد اگرچه فاقد یک یا چند تا از خصوصیات ذکر شده بالا باشد.

روشهای بکاربرده شده

- ۱- آزمایش میکرسکپی مستقیم از ماده ارسالی به آزمایشگاه.
- ۲- کشت ماده آلوده در محیط های معمولی مایع و جامد (در شرایط هوای و بی هوازی).
- ۳- جدا کردن پرگنه های استافیلوکوک و رنگ آمیزی آنها بادر نظر گرفتن اندازه - قوام و ویژگی رنگ پرگنه ها.
- ۴- بررسی خواص بیوشمیک، متابولیک و آنزیماتیک میکروبها نظیر: تخمیر قند مانیتول در محیط (شاپ من).
- انجام تست استافیلوکوک آگلوز و بررسی نتایج آن.
- استفاده از محیط ژلاتین.
- سایر آزمایش ها بعلمت نداشتن وسیله و یا کم اهمیتی آنها در تشخیص، مورد استفاده قرار نگرفتند.
- بادر نظر گرفتن صفات مذکور و میداء میکروب، فقط برای آنهایی که پاتوژن تشخیص داده شده بودند آنتی بیوگرام بعمل آمد.
- آنتی بیوگرامهای انجام شده بطریقه پخش آنتی بیوتیک یا diffusion روی محیط جامد یا دیسک تست باقراردادن دیسک آنتی بیوتیک روی ژلوز صورت گرفته است.

در این روش منطقه عدم پرورش میکربی با Zone Size of Inhibition میزان حساسیت میکروب را نسبت به آنتی بیوتیک معینی تعیین می کند (روش KENNETH و همکاران یا روش شابریت و همکاران). بدیهی است اندازه منطقه عدم رشد میکربی در اطراف دیسک آنتی بیوتیک بعوامل چندی، نظیر قدرت و ضریب پخش آنتی بیوتیک روی ژلوز، سرعت رشد و تکثیر میکربها، تعداد میکرب بکار برده شده، قطر ژلوز و سایر عوامل بستگی دارد. مثلاً در روش کیفی شابریت با دیسک های شش میلی متری معمولی آنتی بیوتیک حساس منطقه عدم رشد بیشتر یا برابر ۱۵ تا ۳۰ میلی متر و حساسیت محدود کمتر از ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر و میکرب مقاوم دارای منطقه عدم رشد ناچیز و یا هیچ است. روش مورد استفاده مادرانجام و قرائت نتیجه آنتی بیوگرام طریقه کنت و همکارانش بوده است.

بررسی آنتی بیوگرام های حاصله از ۲۷۹ سوش (جدول شماره یک) استافیلوکوک پاتوژن جدا شده از بیماران بستری، معرفی شده به آزمایشگاه از بخشهای مختلف بیمارستان شاهرزای مشهد (وابسته بدانشکده پزشکی مشهد) و بیمارستان سرپائی نشان میدهد که:

دارای خاصیت آنتی ژنی است و از ۹۳ درصد استافیلوکوک های جدا شده از عفونت های انسان و ۸۱ درصد استافیلوکوک های جدا شده از حفره بینی افراد بظاهر سالم بدست آمده، میتواند گلبولهای قرمز خرگوش را حل کند.

همولیزین بنا - این همولیزین را که از سویه های بیماریزای حیوانی جدا کرده اند قادر است گلبولهای قرمز گوسفند را حل کند.

همولیزین های آلفا و بتا اگر و توکسین میباشد و دارای خاصیت آنتی ژنیک بوده و میتوان آنها را به آنتو توکسین تبدیل کرد.

بنظر میرسد که کلیه سویه های پاتوژن استافیلوکوک دارای همولیزین باشند منتهی میزان آن ارتباط مستقیمی با ویرو لانس ندارد.

۳- تخمیر قندها:

قندهای زیادی توسط استافیلوکوک تخمیر میشود که از همه مهمتر تخمیر مانیتول است. برای این منظور میکروب را روی محیط (شاپ من) که دارای ژلوز و ۷۵ گرم نمک طعام و ۱۰ گرم مانیتول در هر لیتر محیط کشت و معرف رنگینی بنام سرخ فدل است کشت میکنند. تقریباً تمام استافیلوکوک های پاتوژن قادرند مانیتول را در شرایط هوای و بی هوازی تخمیر کنند در حالیکه استافیلوکوک های ساپروفیت و میکروکوکها (که شباهت شکلی زیادی به استافیلوکوکها دارند) قادر باین کار نیستند و بعضی از سویه های دسته اخیر فقط در شرایط هوای مانیتول را تخمیر میکنند (۱۱).

۴- استافیلوکوک آگلوز:

یکی از ثابت ترین و قابل قبول ترین خواص استافیلوکوک های پاتوژن، منعقد ساختن پلاسمای اگزالات یا سترات دار خون خرگوش و یا خون انسان (گروه O با Rh مثبت) میباشد در حالیکه سایر استافیلوکوکها قادر بانجام این عمل نمیشوند.

ارزش این تست بیش از سایر تست های ذکر شده قبلی است.

۵- وجود آنزیمهای فیبرینولیزین، بویژه هیالورونیداز (که اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته) و ذوب کردن ژلاتین و غیره از جمله دیگر خواص هستند که برای پاتوژن بودن استافیلوکوکها ذکر میشوند ولی مؤلفین مختلف اهمیت کم و بیش زیادی برای آنها قائلند.

۶- حساسیت استافیلوکوک های پاتوژن نسبت بیاکترئوفازهای ویژه طریقه ای جهت تشخیص میباشد که در آزمایشگاههای مجهز مورد استفاده قرار میگیرد.

بدیهی است شناسائی یک سویه استافیلوکوک پاتوژن منحصر بدارا بودن یکی از خواص ذکر شده در بالا نبوده، بلکه آنچه ما را در این امر راهنمایی میکند اولاً علائم بالینی و ثانیاً کانون برداشت میکرب میباشد، مثلاً استافیلوکوک سفیدی که بدفعات متوالی و متعدد

(جدول شماره ۱)

تعداد سوشهای استافیلوکوک پاتوژن از بخشهای مختلف و متفرقه

ردیف	نام بخش	تعداد سوشها
۱	اورولوژی	۱۳ سوش
۲	جراحی پلاستیک	۹ سوش
۳	جراحی اطفال	۱۵ سوش
۴	جراحی استخوان	۴۶ سوش
۵	جراحی عمومی	۴۰ سوش
۶	داخلی و پوست	۲۱ سوش
۷	زنان	۱۳ سوش
۸	قلب و ریه	۲۵ سوش
۹	کودکان	۳۳ سوش
۱۰	چشم و گوش و حلق و بینی	۱۵ سوش
۱۱	متفرقه	۴۹ سوش
	جمع	۲۷۹ سوش

(جدول شماره ۴)

در صورتیکه مقاومت کامل این سوشها نسبت به:

ژانتامیسین ۰/۷ درصد.

سفالوتین ۱۳/۵ درصد.

کلوگزاسیلین ۱۶ درصد (جدول شماره ۲) میباشد.

بحث و تفسیر و نتیجه:

غرض از انتشار این آمار و بررسی، مقایسه نتایج آن با آنتی-بیو گرامهایی که توسط محققان مختلف انجام شده، میباشد. مثلاً آماری که DEBEAUMONT و DURIEZ انتشار داده اند (۲) نشان میدهد که سوشهای جدا شده استافیلوکوک پاتوژن در هر ناحیه ای ممکنست در برابر آنتی بیوتیکهای گوناگون متفاوت باشد، چنانچه در آمار نامبردگان از یکصد سوش استافیلوکوک پاتوژن جدا شده در انستیتو Callot هیچکدام در برابر ژانتامیسین مقاومتی از خود نشان نداده اند و فقط ۴/۱ درصد آنها نسبت به کلوگزاسیلین مقاوم بوده اند. در صورتیکه در آمار ما همانطور که ذکر شد از ۲۷۹ سوش جدا شده استافیلوکوک پاتوژن، ۰/۷ درصد نسبت به ژانتامیسین و ۲۵ درصد در برابر اگزاسیلین از خود مقاومت کامل نشان داده اند.

۷۲/۸ درصد آنها نسبت به ژانتامیسین، ۶۹/۵ درصد آنها نسبت به سفالوتین و ۶۶ درصد آنها نسبت به کلوگزاسیلین حساس بوده اند

جدول شماره (۲)

تعداد سوشهای مقاوم (از مجموع ۲۷۹ سوش استافیلوکوک پاتوژن) و درصد آن

نام بخش	پنی سیلین	اکترام سیلین	کلواکترام سیلین	آمپی سیلین	سفالوتین	استرپتو ميسين	ژانتاميسين	تتراسيكلين	اریتروميسين	کلر آمفنیکل
اورولوژی	۱۱	۴	-	۸	۴	۱۲	-	۱۲	۶	۱۰
جراحی پلاستیک	۷	۱	-	۶	-	۹	-	۸	۳	۶
جراحی اطفال	۱۵	۷	۱	۱۴	۱	۱۴	-	۱۳	۴	۹
جراحی استخوان	۴۴	۱۲	۱۰	۴۱	۷	۴۳	-	۳۷	۱۹	۴۰
جراحی عمومی	۳۶	۱۵	۵	۳۴	۷	۳۴	-	۳۶	۱۸	۲۸
داخلی و پوست و خون	۱۸	۸	۶	۱۹	۲	۲۰	-	۱	۸	۱۷
زنان	۱۳	۴	۱	۱۲	-	۱۲	-	۱۳	۱۰	۹
قلب و ریه	۲۲	۹	۱۱	۲۰	۵	۲۵	۱	۲۲	۱۵	۲۰
کودکان	۳۲	۸	۳	۲۷	۳	۲۹	-	۲۶	۱۰	۲۰
چشم و گوش و حلق و بینی	۱۴	۵	۴	۱۳	۴	۱۳	-	۱۰	۵	۱۲
متفرقه	۴۵	۸	۴	۳۱	۵	۴۴	۱	۳۸	۱۷	۳۸
مجموع	۲۵۷	۷۱	۴۵	۲۲۵	۳۸	۲۵۵	۲	۲۱۶	۱۱۵	۲۰۹
درصد مقاومت (%)	۹۲	۲۵	۱۶	۱۰/۳	۱۳/۵	۹۱	۰/۷	۷۷	۴۱	۲۵

جدول شماره (۳)- تعداد سوشهای نیمه حساس (از مجموع ۲۷۹ سوش استافیلوکوک پاتوژن) و درصد آن

نام بخش	پنی سیلین	اکترا سیلین	کلواکرا سیلین	آمپی سیلین	سفالوتین	استرپتو ميسين	ژانیا ميسين	کتراسیکلین	اریتر و ميسين	کلر آمفنیکل
اورولوژی	۱	۴	۱	۴	۲	۱	۲	-	۴	۲
جراحی پلاستیک	۱	۳	۱	۲	۲	-	۶	۱	۴	۳
جراحی اطفال	-	۳	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۷	۶
جراحی استخوان	۲	۴	۶	۵	۱۰	۳	۱۴	۵	۲۰	۶
جراحی عمومی	۳	۵	۴	۴	۵	۶	۱۰	۲	۱۱	۹
داخلی و پوست و خون	۳	۶	۵	۱	۴	۱	۶	۱	۸	۴
زنان	-	۴	۱	۱	۲	۱	۲	-	-	۳
قلب و ریه	۳	۶	۵	۲	۷	-	۶	-	۴	۵
کودکان	-	۴	۹	۲	۳	۴	۱۰	۲	۸	۱۱
چشم و گوش و حلق و بینی	-	۴	۱	۱	۳	۲	۶	-	۹	۱
متفرقه	۳	۱۸	۱۶	۱۰	۷	۵	۱۱	۴	۱۵	۱۰
مجموع	۱۶	۶۱	۵۰	۳۳	۴۷	۲۴	۷۴	۱۶	۳۲	۶
درصد (%)	۶	۲۲	۱۸	۱۲	۱۷	۸/۵	۲۶	۶	۹۰	۲۱

جدول شماره (۴)- تعداد سوشهای حساس (از مجموع ۲۷۹ سوش استافیلوکوک پاتوژن) و درصد آن

نام بخش	پنی سیلین	اکترا سیلین	کلواکرا سیلین	آمپی سیلین	سفالوتین	استرپتو ميسين	ژانیا ميسين	کتراسیکلین	اریتر و ميسين	کلر آمفنیکل
اورولوژی	۱	۵	۱۲	۱	۷	-	۱۱	۱	۳	۱
جراحی پلاستیک	۱	۵	۸	۱	۷	-	۳	-	۲	-
جراحی اطفال	-	۵	۱۳	-	۱۲	-	۱۴	۱	۴	-
جراحی استخوان	-	۳۰	۳۰	-	۲۹	-	۳۲	۴	۷	-
جراحی عمومی	۱	۲۰	۳۱	۲	۲۸	-	۳۰	۲	۱۱	۳
داخلی و پوست و خون	-	۷	۱۰	۱	۱۵	-	۱۵	۹	۵	-
زنان	-	۵	۱۱	-	۱۱	-	۱۱	-	۳	۱
قلب و ریه	-	۱۰	۹	۳	۱۳	-	۱۸	۳	۶	-
کودکان	۱	۲۱	۲۱	۴	۲۷	-	۲۳	۵	۱۵	۲
چشم و گوش و حلق و بینی	۱	۶	۱۰	۱	۸	-	۹	۵	۱	۲
متفرقه	۱	۲۳	۲۹	۸	۳۷	-	۳۷	۷	۱۷	۱
مجموع	۶	۱۴۷	۱۸۴	۲۱	۱۹۴	-	۲۰۳	۴۷	۷۴	۱۰
درصد (%)	۲	۵۳	۶۶	۷/۵	۶۹	-	۷۲/۵	۱۶	۲۶	۴

جدول شماره (۵) حساسیت، مقاومت و حساسیت نسبی استافیلوکوکها و درصد حاصله

ردیف نوع آنتی بیوتیک	تعداد سوشها			درصد (%) سوشها		
	مقاوم	نیمه حساس	حساس	مقاوم	نیمه حساس	حساس
۱ پنی سیلین	۲۵۷	۱۶	۶	۹۲	۶	۲
۲ اگزاسیلین (۵)	۷۱	۶۱	۱۴۷	۲۵	۲۲	۵۳
۳ کلوگزاسیلین (۵)	۴۵	۵۰	۱۸۴	۱۶	۱۸	۶۶
۴ آمپی سیلین (۲۵)	۲۲۵	۳۳	۲۱	۸۰/۳	۱۲/۲	۷/۵
۵ سفالوتین (۳۰)	۳۸	۴۷	۱۹۴	۱۳/۵	۱۷	۶۹/۵
۶ استرپتومیسین	۲۵۵	۲۴	-	۱۹/۵	۸/۵	-
۷ ژانتامیسین (۳۰)	۲	۷۴	۲۰۳	۰/۷	۲۶/۵	۷۲/۸
۸ تتراسیکلین (۳۰)	۲۱۶	۱۶	۴۷	۷۷/۲	۶	۱۶/۸
۹ اریترومیسین	۱۱۵	۹۰	۷۴	۴۱/۴	۳۲/۲	۲۶/۴
۱۰ کلرامفنیکل (۳۰)	۲۰۹	۶۰	۱۰	۷۵	۲۱	۴

جدول شماره (۶) مقایسه مقاومت استافیلوکوکهای پاتوژن سه آمار مختلف در برابر آنتی بیوتیکها

نام آنتی بیوتیک	آمار A. Debeaumont.	آمار BRISOU	آمار ما
پنی سیلین G	۲۴/۸	۶۳-۹۵	۹۲
استرپتومیسین	۴۰	-	۹۱/۵
ژانتامیسین	صفر	۴	۰/۷
هاکروئید (اریترومیسین)	۱۴/۴	۲۰-۳۰	۴۱/۴
سفالوپورین	۱۱/۱	۶/۵	۱۳/۵
متی سیلین	۱۳/۳	۳۰-۶۵	-
تتراسیکلین	۳۴	۴۰	۷۷/۲

بعلاوه از میان آنتی بیوتیکهایی که استافیلوکوک در برابر آنها مقاومت نسبتاً زیادی از خود نشان داده میتوان بترتیب استرپتومیسین، پنی-سیلین، تتراسیکلین، کلرامفنیکل و آمپی سیلین را نامبرد (جدول شماره ۵ و ۶) و بدین ترتیب چنین نتیجه گیری میشود که:

ژانتامیسین، سفالوتین و کلوگزاسیلین بترتیب داروهای مؤثر بر روی استافیلوکوکهای جدا شده میباشد (جدول ۵ و ۶) و بطور خلاصه میتوان گفت که حساسیت یا مقاوم سوشهای استافیلوکوک پاتوژن نسبت به آنتی بیوتیکها در نواحی مختلف تاحدی بایکدیگر متفاوت و متغیرند.

REFERENCES.

- 1- BONNET, H. NEVOT, P&A.: Travaux pratiques de bactériologie médicale. Paris, Masson et Cie. 1964.
- 2- BRISOU, J.: Traitement actuel des septicémies et des infections staphylococciques. Cahiers de Médecine, 1970, 11, N:13.
- 3- CHABBERT, Y.A.: Détermination de la sensibilité microbienne aux antibiotiques, methode de disques. Cours de l'Institut Pasteur.
- 4- DUMAS, J. & Coll.: Bacteriologie médicale. Collection médico chirurgicale, Paris.
- 5- DURIEZ, DEBEAUMONT, A.: Staphylocoques d'origine hospitalière. Etude de la sensibilité de 100 souches aux antibiotiques, Nouvelle presse médicale de médecine. 1972. N:15. 1017.
- 6- FASQUELLES, R.: Elements de bactériologie médicale. Ed Flammarion, Paris, dernière édition.
- 7- KENNETH, RYAN & Col. Disc sensitivity testing. Reprinted from hospital practice. Vol: 5, 1970.
- 8- JAWETZ, E & Col.: Review of medical microbiology. Long medical publication. Los Altos, California, 1972.
- 9- MOUSTARDIER, G.: Bactériologie médicale, 4ème. Ed. Paris. 1972.
- 10- STANER, DOUDOROFF. ADELBERG.: The microbial world. Published by rentice-hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J.
- 11- SAZEGAR, T. (Etemad-Rezai): Contribution à l' étude de l'attaque du mannitol par le staphylocoque (Résultats obtenus sur 150 souches). Thèse, Paris, 1965.