

آزمون‌های عملی در سمع قلب

(یک طریقه مفید در تشخیص افتراقی صداها و سوفلهای قلب)

مجله علمی نظام پزشکی

سال سوم، شماره ۲، صفحه ۱۵۳، ۱۳۵۲

دکتر منوچهر نديمی *

قلب را نزد کسانی که دچار ضایعات دریچه‌های قلب هستند کم کنیم ازشدت سوفل خواهیم کاست وی برای این منظور Amylnitrate و Braunwald را مورد استفاده قرار داد. بعد از تغییرات همودینامیک حاصله از تزریق ایزوپرل-نیتروگلیسیرین-دیپتالرا نزد بیماران مبتلا به تنگی عضلانی زیر دریچه‌ای ائورت (Idiopathic Subaortic Stenosis) مورد مطالعه قرار دادند. این متخصصین شدت سوفل قلبی را قبل و بعد از مصرف این داروها بوسیله فونوکاردیوگرافی نشان دادند.

نحوه عمل داروها در تغییر سوفلهای قلبی ۱- Amylnitrate و نیتروگلیسیرین - این دو دارو باعث اتساع عروق، کم شدن فشار خون شریانی، ازدیاد سرعت جریان خون در آئورت، تندی سرعت رانده شدن خون از بطن چپ به آئورت، افزایش مقدار خون وریدی بازگشته به دهلیز راست و تند شدن ضربان قلب میگردد. در اثر پائین افتادن فشار خون شریانی از طریق واکنش کاروتید، ضربان قلب تند میشود و این امر باعث تشدید سوفل تنگی دریچه میترال میگردد. ولی سوفلهای مریوط به نارسائی میترال و آئورت بعد از مصرف این داروها اکثراً خفیف میشوند. در تنگی زیر دریچه‌ای آئورت (نوع عضلانی) سوفل سیستولیک شدیدتر میشود. نیترات امیل، سوفل سیستولیک تنگی شریان ریوی را نیز تشدید میکند.

۲- Methoxamine - این ماده که یک داروی بالا بردنه فشار خون است باعث شدید شدن انقباض شرائین و بالا رفتن فشار سیستولیک بطن چپ میشود. لذا سوفلهای را که به انقباض بطن

هر قدر اعکانات دنیای پزشکی برای معالجه جراحی بیماریهای قلبی افزایش می‌یابد، اهمیت تشخیص صحیح قبل از عمل اینکه بیماران نیز زیادتر میشود. تشخیص بیماریهای قلبی بوسیله سمع صحیح، الکتروکاردیوگرافی، فونوکاردیوگرافی، مطالعات پرتوشناسی و کاتهتریسم قلبی صورت میگیرد. بهره‌برداری از روش‌های جدید چون کاتهتریسم و آنژیوگرافی نه تنها از اهمیت گوش کردن دقیق و صحیح قلب نکاسته، بلکه بر عکس ارزش این وسیله آسان و قدمی را صد چندان کرده است و در مواد دیگر بدلائل گوناگون نمیتوان برای تشخیص بیماری قلبی از کاتهتریسم و آنژیوگرافی استفاده کرد، اهمیت هنر گوش دادن به قلب کاملانه نمایان میگردد. در گوش دادن به قلب اطلاعاتی درخصوص شدت و ضعف صداهای قلبی، دو تاشدن آنها، وجود سوفل های سیستولیک و دیاستولیک و مشخصات خاص این سوفلها بدست می‌آید. معمولاً معاینه بیمار در موقع استراحت که برونده (Debit) قلب کمترین است صورت میگیرد. ولی گاهی متخصصین، معاینه بالینی را بعد از ورزش و یا تغییر دادن وضعیت بیمار تکرار میکنند.

امروزه روش‌های دقیق تری وجود دارد که بوسیله آنها میتوان باسانی وضع فیزیولوژیک قلب را عوض کرد و اطلاعات لازم را بدست آورد.

أنواع تست‌های عملی:

داروها - سالها است که در مطالعه سوفلها امکان تغییر برونده قلب بوسیله تزریق بعضی از داروهای مورد بررسی قرار گرفته است. Kamler برای اولین بار نشان داد که اگر ما مقدار برونده

به دهليز راست، ازشدت کلیه سوفل های قلبی کاست ميشود. بعد از پایان این مانور (۵٪ تا ۱/۲ ثانیه) سوفل های مربوط به قلب راست شدید تر ميشوند در حالیکه سوفل های مربوط به قلب چپ اندک زمانی دير تر (۲/۸ تا ۶/۸ ثانیه) شدت مibايند انجام اين مانور در کودکان جوان تر از ۶-۸ سال و در افرادی که دچار تنگی نفس هستند غير عملی است.

بکار بردن داروها در تشخيص افتراقی سوفلها و صداهای قلبی:

۱- Amylnitrate :

چنانچه قبل از ذکر شد اين دارو باعث کم شدن مقاومت عروق محيطی، بالا رفتن مقدار خون وريدي بازگشته به دهليز راست و تنفس شدن ضربان نبض ميشود. نيترات داميل سبب ضعيف شدن سوفل دیاستولیک نارسائی آئورت و سوفل سیستولیک مربوط به بين دوبطن و یانارسائی میترال ميشود. لذا در تشخيص افتراقی نارسائی میترال و ارتباط مادر زادي بين دوبطن کمک نمیکند، ولی چون سوفل دیاستولیک تنگی در يچه میترال را بعلت ايجاد تاکيكاري شدیدتر میکند، نيترات داميل میتواند در تشخيص افتراقی نارسائی آئورت و تنگی میترال بکار برده شود. (در اولی سوفل دیاستولیک خفیفتر و در دومی شدیدتر ميشود).

مورد مهم دیگر تشخيص افتراقی بين تنگی شريان ريوی و تنرا لوژی فالو است. زیرا سوفل سیستولیک مربوط به تنگی شريان ريوی با مصرف نيترات داميل شدیدتر و در تنرا لوژی فالو خفيف ميشود.

در تشخيص افتراقی تنگی واقعی و تنگی نسبی در يچه میترال (Austin Flint) نيز مصرف اين دارو ارزش دارد زيرا در حالت اول سوفل دیاستولیک شدیدتر و در حالت دوم خفيف تر ميشود. در تشخيص افتراقی سوفلهاي دیاستولیک نارسائی آئورت و نارسائی شريان ريوی نيز مصرف نيترات داميل ممکن است مفيض واقع شود زيرا در بيماری اول سوفل دیاستولیک خفيف تر شده و در دومی شدیدتر ميگردد.

۲- Methoxamine :

اين دارو باعث از ديد مقاومت عروق محيطی - کم شدن خون بازگشته وريدي به دهليز چپ و کند شدن نبض ميگردد. تشخيص افتراقی بين سوفل سیستولیک نارسائی میترال و ارتباط بين دوبطن با مصرف اين دارو مقدور نیست چه در هر دو حالت سوفل سیستولیک شدیدتر ميشود. ولی میتوان ارتباط بين دو بطن و تنرا لوژی فالو را بدينوسيله از هم تشخيص داد زيرا در اولی سوفل سیستولیک شدت يافته و در دومی خفيف تر ميگردد.

چپ ارتباط دارند شدید میکند (مثل سوفلهای نارسائی میترال، نارسائی آئورت، ارتباط مادر زادي بين دو بطن و باز بودن کanal شرياني). تشدید سوفل نارسائی آئورت بعلت بالا رفتن مقدار خون رانده شده به آئورت و متعاقب آن، افزایش مقدار خون بازگشته به بطن چپ در مرحله دیاستول، ميباشد.

۳- Serotonin - گفته ميشود که اين دارو باعث انقباض عروق شريان ريوی شده و سوفلهای مربوط به قلب راست را شدیدتر میکند. ولی عملاً هميشه تأثير اين ماده بر اين سوفلها يكسان نیست. گاهی سروتونین يمشتر باعث ازدياد انقباض عروق محيطی ميشود تا شريان ريوی، و افاده مختلف نيز ممکن است واکنش های متفاوتی نسبت باین دارو از خود نشان دهند.

۴- Isuprel - باعث ازدياد قدرت و سرعت انقباض عضله بطن چپ ميشود و لذا سوفل مربوط به تنگی عضلانی زين در يچه ای آئورت را تشدید میکند. همچنین ايزوبريل باعث تندي ضربان قلب و لذا کوتاه شدن دوره سیستول قلب ميشود و بنا بر اين سوفلهاي تنگی در يچه میترال و سه لقی را شدید تر میکند. سوفل تنگی نسبی در يچه میترال (Austin Flint Murmur) بعداز مصرف نيترات داميل و نيترو گلسيرین ضعيف تر ميشود.

تنفس :

در مطالعات فونوكار ديو گرافی معمولاً صداها و سوفلهای قلبی را در دم و باز دم ثبت میکنیم. دم باعث زياد شدن خون وريدي بازگشته به قلب راست و از ديداد گردش خون در شريان ريوی ميشود و برای مسدت کوتاه جريان خون در قلب چپ نقصان می يابد. باز دم اثر عکس آنچه که ذکر گردید دارد. دم باعث بازشدن دو قسمت آئورتی و ريوی صدای دوم از هم ميگردد (غير اذ بيمارانيکه دچار ارتباط مادر زادي بين دهليز هستند). گفته ميشود که سوفلهای مربوط به قلب راست با شهيق شدیدتر شده و سوفلهای قلب چپ خفيف تر ميگردد ولی Levin معتقد است که غير از سوفلهای مربوط به در يچه سه لقی که با شهيق شدیدتر ميشوند اغلب سوفلهایي که از روی جدار قفسه صدری ثبت ميشوند با شهيق خفيف تر ميگردد. لذا بمنظار اين كارشناس فونوكار ديو - گرافی، از بين سوفلها، تنها سوفلهای مربوط به در يچه سه لقی است که تغيير آن با دم و باز دم از نظر باليني قابل اعتماد است و تغييرات ساير سوفلها در دم و باز دم نميتواند از نظر باليني قابل تغيير باشند.

مانور Valsalva :

با انجام دادن مانور والساوا بعلت کاهش خون وريدي بازگشته

سایر سوفلها خشن و قوی می‌شود، لذا با مصرف این دارو می‌توان تا حدودی بین تنگی دریچه‌ای و ذین دریچه‌ای عضلانی آثوت تشخیص افتراقی داد.

۳- ایزوپرول (Isoproterenol) این دارو قدرت و سرعت انقباض عضله بطن را زیادتر می‌کند و اکثر سوفل‌ها بعد از تزریق این دارو شدیدتر می‌شوند، ولی سوفل سیستولیک مر بوط به تنگی عضلانی ذین دریچه‌ای آمورت بیش از

REFRENCES :

- 1- Kahler, H., Arch. Inn. Med. 23: 349, 1933
- 2- Braunwald, E., Brockenbrough, E. C. and Frye, R. L., Circulation, 26 : 166 (1962)
- 3- Brockenbrough, E. C., Barunwald. E. and morrow, A. G, Circulation 23: 189 (1961)
- 4- Barlow, J, et al: Brit. Heart j., 20: 162 (1958)
- 5- Vogelpoel, L. et al; Am. Heart j ., 62: 101 (1961)
- 6- Kiger, R. G. : Clin, Res., 11: 24 (1963)
- 7 Braunwald, E. et al : Circulation, 29 : 422 (1964)
- 8- Marcus, F. I. et al : Am, Heart j. , 68 : 468 (1964)
- 9- Fishleder, B. L. et al, IV word congr. Cardiol: Mexico city, P. 124 (1962)
- 10- Zinsser, H. F. et al : Circulation 1 : 523 (1950)
- 11- Sarnoff ' S. J. et al : Am. j . Physiol., 154 : 316 (1948)
- 12 -Endrys, J. et al : Brit. Heart J. , 24 : 207 (1962)
- 13- Bousvaros, G. A. : Am. j . Cardiol. , 8 ; 328 (1961)