

كمك به تغذيه نوزادان مبتلا به كام شكفدار (Cleft Palate)

مجله نظام پزشکی

سال هشتم، شماره ۱، صفحه ۴۷، ۱۳۶۰

دکتر عباسعلی صحافیان *

مقدمه :

هدف از ارائه این مقاله آشنا نمودن همکاران با نحوه استفاده از دستگاه ساده اکریلیک برای نوزادان مبتلا به کام شکفدار است که مشکل تغذیه یا تنفس دارند. علاوه بر موضوعات کلی راجع به این قبیل نوزادان، روش قالب گیری، ساختن دستگاه، مراقبت های بعد از بکار گرفتن دستگاه و نقش مادر نیز شرح داده میشود و در آخر به معرفی بیمارانی که به بخش اورتودنسی این دانشکده مراجعه کرده اند، می پردازیم.

کلیات :

آمار مختلف نشان میدهد که شیوع شکاف کام و لب باهم اختلاف دارند.

Walther (۸) میگوید بطور کلی در هر چهارصد تولد يك طفل مبتلا به شكاف كام بدون شكاف لب دیده میشود و در هر هزار تولد، يك نوزاد مبتلا به شكاف لب (همراه یا بدون شكاف كام) وجود دارد.

همچنین وی معتقد است که شایعترین علت شكافهای لب و کام عامل ارث و خانواده است.

Richard (۶) علاوه بر ارث احتمال مؤثر بودن عوامل زیر را در ایجاد شكاف لب و کام خاطر نشان میسازد مانند مادرانیکه خود نارس بدنیا آمده اند، فشارها و تألمات روحی، کمخونی، عکس العملهای آلرژیک و عفونت های ویروسی مادر.

در جنین شناسی Orban (۷) آمده است که شكاف لب بعلت عدم

اتصال مزودرم (Mesoderm)، رویداد فکی (Maxillary process) يك یا دوطرف و پیشانی (Frontal Proccss) می باشد که باید در هشتمین هفته زندگی داخل رحمی متصل گردند. شكاف كام بعلت عدم اتصال Nasal process و Maxillary Process و Palatal plate بوجود می آید که باید در حدود هفته دهم تا دوازدهم زندگی داخل رحمی بهم متصل شوند.

درمان نوزادان مبتلا به كام شكفدار : این درمان شامل سه مرحله میشود.

درمان قبل از جراحی كام، جراحی كام و پس از جراحی كام.

هدف در این مقاله بیشتر درمان قبل از جراحی است که خود بدو دسته تقسیم میشود.

اول معالجات ارتوپدی که میتوان قطعات منحرف شده استخوان آلوئول را بهم نزدیک نمود.

این نوع درمان باید زیر نظارت تیم انجام پذیرد که این تیم معمولا از جراح متخصص فك و صورت، متخصص جراحی پلاستیک، متخصص ارتودنسی و بالاخره متخصص تکلم تشکیل شده است که با مشورت با دیگر اعضاء درمان انجام و پی گیری میشود.

دوم مواردیست که احتیاج به معالجات ارتوپدی فك و آلوئول نیست و تنها يك دستگاه ساده اکریلیک میتواند كمك مؤثرتری به تغذیه و تنفس نوزاد بنماید.

سابقه درمان قبل از جراحی اکنون به نیم قرن میرسد و کارهای

* مشهد - دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه مشهد.

برای اینکه زبان نوزاد را برای پذیرش دستگاه جدید که معمولاً حدود سه یا چهار روز پس از تولد در دهان گذارده میشود، آماده نماییم ابتدا از پستانک‌های مخصوص که سر نسبتاً عریض دارد و سوراخ آن درست در انتهای پستانک باز نمی‌شود، بلکه چند میلی متر به انتها سوراخ را ایجاد کرده اند، استفاده میکنیم. این پستانک را طوری در دهان قرار میدهند که سوراخ آن بطرف عقب و پائین زبان باز شود و شیر را مستقیماً بطرف پائین و عقب هدایت کند. همچنین این پستانک به علت بزرگتر بودن از پستانک‌های معمولی قادر است تمام قوس فك بالا و شکاف سقف دهان را در موقع شیر خوردن بپوشاند و از خروج شیر از بینی جلوگیری نماید. در حالیکه میتوان از این نوع پستانک استفاده کرد، دستگاهی نیز ساخته شده است که بزودی در دهان نوزاد قرار میگیرد.



شکل شماره ۲- قالب گیری توسط تری اختصاصی اکریلیک و ماده لاستیکی

قالب گیری از دهان نوزاد مبتلا به کام شکافدار : در صورتیکه تری‌های (Trays) کوچک فلزی یا اکریلیک مخصوص وجود نداشته باشد، قالب گیری ابتدائی توسط قطعه کوچک Compond گرم و بکمک دوانگشت که وارد دهان نوزاد میشود انجام میگردد سپس بکمک این قالب تری اختصاصی ساخته میشود و در قالب گیری اصلی از ماده Rubber - Based و از نوع Havy Body آن استفاده میگردد (شکل ۲). این ماده پس از قرار گرفتن در دهان بحالت لاستیکی درمیآید و خطر پاره شدن و ورود به مجاری تنفسی بسیار کم و براحتی قابل خروج از دهان است (شکل ۳). مهمتر اینکه این ماده دقیق و مطمئن است و تغییر شکل نمیدهد. بنابراین دستگاه

Brophy (۱) و Kyellgren (۴) و Moneil (۵) و Broston (۲) تا سال ۱۹۵۸ سبب توسعه این معالجات شد. در نتیجه امروز میتوان با ساختن يك دستگاه ساده به عمل تنفس و تغذیه این قبیل نوزادان کمک کرد.

در سمپوزیوم بین‌المللی زوریخ در سال ۱۹۶۴ تأیید شد که درمان قبل از جراحی برای نوزادان کام شکافدار امتیازات زیر را دربر دارد.

۱- اطمینان به والدین که اقدام لازم برای درمان نوزادشان انجام شده و بزودی این نوزاد مانند بقیه نوزادان قادر به ادامه زندگی طبیعی خواهد بود.

۲- تسهیل در امر تغذیه و تنفس نوزاد.

۳- تسهیل در عمل جراحی و دوختن کام.


۴- کاهش ناهنجاری فکی و دندانی.



شکل شماره ۱- طفل مبتلا به شکاف يك طرفه لب و شکاف کامل کام

کمک به تغذیه و تنفس نوزادان مبتلا به لب و کام شکافدار (شکل ۱) باین ترتیب است که ابتدا چند روز پس از تولد از فك بالای نوزاد قالب گیری کرده و روی مدل بدست آمده يك دستگاه ساده اکریلیک ساخته شود. این دستگاه چند روز پس از تولد در دهان نوزاد گذارده می‌شود.

دستگاه تمام فك بالا را که شکاف دارد می‌پوشاند و از ورود غذا و زبان بداخل شکاف کام جلوگیری میکند و باعث میشود که زبان عمل طبیعی خود را نسبت به کام انجام دهد. غالباً دستگاه توسط يك نوار خارج دهانی (Extra - oral) در دهان نگاهداری میشود.



شکل شماره ۵- موم گذاری قسمتهای شکاف آلولول و کام روی مدل گچی


چون نوزاد در حال رشد سریع است این دستگاه باید به فاصله چند هفته یکبار تمویض گردد.

مراقبت از نوزاد مبتلا به کام شکافدار که از دستگاه ساده اکریلیک استفاده میکنند :

پس از گذاشتن دستگاه در دهان نوزاد (شکل ۸)، گاهی زخمهای مخاطی ایجاد میشود که احتمالاً مربوط به فشاری است که دستگاه به مخاط میآورد. اغلب گذاشتن دستگاه در دهان توسط افراد کم تجربه باعث صدمه بیشتر به بافتهای دهان میگردد.

در عین حال عواملی وجود دارند که ایجاد زخمها را تسریع می کنند مانند وجود Aphthae و Candida Albicans و Herpes در دهان نوزاد.


دکتر Johnson (۳) در نوزادان مبتلا به کام شکافدار که همگی از دستگاه ساده اکریلیک در دهان استفاده میکردند، مشاهده کرد که حدود ۸۶٪ آنها دارای زخمهای مخاطی هستند که بیشترین




شکل شماره ۳- نمای ماده قالب گیری بلافاصله پس از خروج از دهان

ساخته شده روی مدل بدست آمده از این قالب (شکل ۴) تطابق کاملتری با انساج ظریف مخاط کام نوزاد دارد. تنها عیب این ماده طولانی بودن زمان سخت شدن آنست (۶-۸ دقیقه) که باید چند دقیقه در خارج از دهان نگاهداری شده سپس وارد دهان نوزاد گردد. زیرا نگهداری طفل کوچک در مدت ۶-۸ دقیقه کار ساده ای نیست به همین جهت بعضی از متخصصان ترجیح میدهند با مواد آلژینات قالب گیری نمایند که مدت زمان سخت شدن آن بمراتب کمتر (۲ دقیقه) است و بطور کلی نیاز را در ساختن وسیله مورد نظر تأمین مینماید.

ساختن دستگاه اکریلیک : شرح کامل ساختن دستگاه در آزمایشگاه در این مقاله لازم بنظر نمی رسد به همین علت تنها توسط شکل های ۵ و ۶ و مراحل مختلف نشان داده شده است. یادآور می شود که بهتر است از اکریل بی رنگ استفاده گردد و در صورت امکان بطریقه پختن انجام شود.



شکل شماره ۶- دستگاه ساخته شده روی مدل گچی




شکل شماره ۴- مدل گچی بدست آمده از قالب گیری با ماده لاستیکی

گاهی واکنش‌های پوستی در محل خروج و بستن نوار خارج دهانی دیده می‌شود که بیشتر در مناطق حاره وجود دارد و برای برطرف نمودن آن از Nystatin استفاده می‌شود. معمولاً سعی بر اینست که کمتر از نوار خارج دهانی استفاده شود.

نقش مادر : نقش مادر در درمان نوزاد مبتلا به لب و کام شکافدار بسیار مهم است. باید حتی الامکان از علاقه و غریزه او برای جلب همکاری بیشتر استفاده کرد. بهتر است زه نیکه مادر در بیمارستان می‌باشد یا اولین بار که به کلینیک ارتودنسی مراجعه می‌کند او را با واقعیت روبرو کرد و اهمیت درمان و میزان همکاری او را گوشزد نمود، در همین جا است که باید طرز کار بستن کام مخصوص را باو آموخت.

معرفی بیمار به جراح : اغلب جراحانی که در این رشته همکاری می‌کنند، عقیده دارند که جراحی لب باید حدود ۳ ماهگی پس از تولد، در صورتیکه وزن طفل حدود ۵ تا ۸ کیلوگرم است و جراحی کام بعد از سن ۹ تا ۱۲ ماهگی انجام شود.

بهر حال وجود دستگاه اکریلیک کمک مؤثری برای جراح محسوب می‌شود و طفل را در حالیکه دستگاه اکریلیک در دهان دارد به جراح معرفی می‌کنیم و در صورتیکه طفل مبتلا به شکاف لب هم باشد یک یا دو هفته قبل از عمل توسط نوارهای چسبنده بافت نرم را بهم نزدیک می‌نمائیم تا کتش بخیه بافت نرم سبب پاره شدن نسج نگردد و احتیاج به عمل دوباره نشود (شکل ۱۰).



شکل شماره ۷- نمای کام دستگاه ساخته شده

زخمها (۴۴ درصد) در لبه تیغه بینی دیده می‌شوند. این زخمها در شروع درمان و کار گذاشتن دستگاه در دهان بیشتر دیده می‌شوند و پس از چندی که مخاط عادت به تماس با این جسم خارجی را پیدا کرد از میزان زخمها نیز کاسته می‌شود (شکل ۹).

ساده‌ترین راه برای درمان این زخمها برداشتن دستگاه از دهان نوزاد است. اگر دستگاه فقط برای تسهیل در امر تغذیه ساخته شده است و از آن برای اعمال ارتوپدی فك و تصحیح قوسهای منحرف الوئول استفاده نمی‌شود، میتوان آنرا فقط در مواقع شیردادن به نوزاد استفاده کرد. در این صورت امکان ایجاد زخم به حداقل

میرسد.



شکل شماره ۹- زخم ایجاد شده روی تیغه بینی بلافاصله پس از بکار گرفتن دستگاه



شکل ۸- طرز قرار گرفتن دستگاه در دهان و نوار خارج دهانی

ماده دقیق و مطمئن است و تغییر شکل نمیدهد. بنابراین دستگاه

باز

دستگاه ارتوپدی تصحیح کننده قطعات منحرف شده آلوئول لازم داشتند. ده تن دیگر فقط از دستگاه ساده اکریلیک شرح داده شده در این مقاله استفاده کردند که برای کمک به امر تغذیه نوزاد لازم بنظر می رسید.

همکاری والدین در مواردیکه از دستگاه ساده اکریلیک استفاده میشد بمراتب بهتر از زمانی بود که دستگاه بمنظور تصحیح قطعات منحرف آلوئول بکار میرفت. چون در مورد دوم اشکالات هم بمراتب بیشتر بود.

نتیجه:

اگرچه نتیجه گیری آماری از بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه فردوسی بعلمت عده کم مراجعان منطقی بنظر نمی رسد ولی با توجه به بخشهای مختلف این مقاله و تجربه چند ساله در این رشته میتوان چنین نتیجه گیری کرد که:

۱- بیش از پنجاه درصد نوزادان مبتلا به کام شکافدار فقط احتیاج به دستگاه ساده اکریلیک شرح داده شده در این مقاله را دارند.

۲- روش قالبگیری وساختن ومراقبت های بعد از کار گذاشتن این دستگاه در دهان نوزاد ساده و برای اغلب دندانپزشکان امکان پذیر است.

۳- دستگاه مورد نظر میتواند از اشکالات تغذیه و تنفس نوزاد که اغلب والدین با آن درگیر هستند بمراتب بکاهد.

۴- در اثر استفاده از دستگاه ساده اکریلیک وضع تغذیه ورشد و نمو طفل نیز بهتر شده و او را هرچه بهتر و سریعتر برای عمل جراحی لب و کام آماده میسازد.

۵- چون از همان روزهای اول تولد با ساختن این دستگاه ساده بکمک والدین این قبیل نوزادان میشتاییم بهمین جهت امید به بهبود طفل را در دل ایشان زیاد کرده و باعث جلب همکاری هر چه بیشتر والدین میشویم.

REFERENCES:

- 1- Brophy, T.W.: Cleft lip and Cleft palate. J. Amer. Dent. Assoc. 14: 11, 8-15. 1927.
- 2- Brostone, W. R.: The Early Orthodontic Treatment of Cleft Palate Conditions. Dent. pract. 9 : 41 - 52. 1958.
- 3- Johnson, S. S.: Symposium on the Early Treatment of the Cleft lip and palate. Brit. J. Orthod. 1: 11 - 14, 1975.
- 4- Kyellgren, B.: Dental Orthopaedic Treatment Combined with Surgery. Transactions of the European Orthodontic Society. 26: 164, 1948.
- 5- Moneil, C. K.: Oral and Facial Deformity. Pitman, London. 1954.
- 6- Richard, B.S.: Cleft palate a multidiscipline approach Haroer and Row, publishers. New York and London. 1968.
- 7- Sicher, H.: Orban, S.: Oral Histology and Embryology the C. V. Mosby Company. 1966.
- 8- Walther, D. P.: Orthodontic Notes. Bristol: John Wright and Sons Ltd. 1967.



۱۰- نحوه قراردادن نوار چسبنده روی لب بالا.

بیماران مبتلا به لب و کام شکافدار که به بخش ارتودنسی مراجعه کرده اند:

در مدت حدود سی ماه، بیست و دو بیمار مبتلا به کام و لب شکافدار از مناطق مختلف استان خراسان توسط جراحان پلاستیک یا فک و صورت به بخش ارتودنسی دانشگاه فردوسی فرستاده شدند. از این عده ده تن دختر و بقیه پسر بودند.

یک تن بیشتر از پنج سال و سه تن بین یک تا پنج سال و بقیه کمتر از یکسال و اغلب نوزاد بودند.

برای چهارتن از این عده دستگاهی ساخته نشد چرا که انحراف قطعات آلوئول و اشکالات تغذیه و تنفس وجود نداشت.

برای هیجده نوزاد دستگاه ساخته شد. هشت تن از این عده