



مقالات تحقیقی (۷)

نقش پاتوژنهای باکتریایی عفونت بیمارستانی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکها در زخمهای جراحی

چکیده

به منظور بررسی نقش عوامل باکتریایی در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی در زخمهای بعد از اعمال جراحی در بیماران بستری در بخش‌های جراحی طی خرداد ماه ۱۳۷۶ تا دیماه ۱۳۷۶ تعداد ۱۱۸ نمونه زخم جراحی از مراجعین بستری در بخش‌های جراحی دو مرکز آموزشی - درمانی در تهران پس از تنظیم پرسشنامه در محیط ترانسپورت جمع‌آوری و با استفاده از امکانات انستیتو پاستور ایران و مراکز یاد شده مورد مطالعه، کشت و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی قرار گرفتند. در این بررسی ۵۷ مورد (۴۸/۳٪) کشت مثبت مشخص گردید که موارد مثبت بر حسب انواع زخمها شامل ۵ مورد (۸/۸٪) زخم تمیز، ۱۴ مورد (۲۴/۶٪) زخم تمیز آلوده، ۱۶ مورد (۲۸/۱٪) زخم آلوده و ۲۲ مورد (۳۸/۵٪) زخم کثیف بودند.

شایعترین باکتریهای پاتوژن که از انواع زخمهای بعد از اعمال جراحی جدا گردید به ترتیب آنتریباکتریاسه‌ها (ایشیریشیاکلی - کلبسیلا - آنتریباکتر) ۵۴/۷ درصد، استافیلوکوکوس اورئوس ۱۴ درصد، استافیلوکوکوس کواگولاز منفی ۱۲/۳ درصد، پیتواستریترکوکوس آناتروبیوس ۸/۵ درصد، استریترکوکوس غیر گروه A ۷/۱ درصد و پزودوموناس آنروژینوزا ۳/۴ درصد می‌باشند.

در این مطالعه بین جنس و سن بیماران با عفونت ایجاد شده اختلاف آماری معنی‌دار مشاهده نشد ($P > 0.05$)، اما بین مدت زمان بستری شدن بیماران و افزایش عفونت زخم رابطه آماری معنی‌داری بدست آمد ($P < 0.05$).

دکتر شهاب مدرس

دانشیار انستیتو پاستور ایران، گروه

میکروپزشناسی

کامیار متواضع

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه

میکروپزشناسی



در انجام آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی بیشترین میزان در آنتروباکتریاسه‌ها نسبت به سفالوسپورین‌های نسل سوم، در استافیلوکوکوس اورئوس به وانکومایسین و نوروفلوکساسین، در پزودوموناس، استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی به سیپروفلوکساسین و در استرپتوکوکوس نسبت به پنی‌سیلین G مشاهده گردید.

واژه‌های کلیدی: عفونت بیمارستانی، باکتریایی، زخم، جراحی، آنتی‌بیوتیکها

مقدمه

عفونت بیمارستانی^(۱) عبارت از عفونتهایی است که توسط عوامل میکروبی در مدت بستری شدن در بیمارستان کسب می‌گردند. عفونت بیمارستانی امکان دارد بیماران و سایر افرادی را که به طریقی با بیمارستان در تماس می‌باشند نظیر کارکنان امور پزشکی، کارگران خدماتی و فروشندگان یا ملاقات کنندگان را در برگیرد[۱].

براساس مطالعات انجام شده عفونت بیمارستانی از مسایل مهم بهداشتی در اکثر کشورهای جهان محسوب می‌شود. عفونت اداری به عنوان شایعترین و سپس زخمهای متعاقب اعمال جراحی، پنومونی، باکتریی و سایر عفونتها موارد عفونت بیمارستانی را تشکیل می‌دهند. برخی از مراکز بهداشتی، میزان مرگ بیماران دچار عفونت زخم بعد از اعمال جراحی را بیش از ۲۰ درصد گزارش نموده‌اند[۱،۲].

در اکثر موارد بیماران دچار عفونت بیمارستانی، عفونت را در طی دوره بستری شدن در بیمارستان آشکار می‌سازند، اما امکان دارد که شروع بیماری بعد از مرخص شدن بیماران حاصل گردد، زیرا ۲۵-۲۰ درصد عفونت‌های زخم بعد از اعمال جراحی متعاقب خروج بیماران از بیمارستان شروع به ظهور علایم عفونت می‌کنند. در این موارد

بیمار در بیمارستان کلونیزه می‌شود اما دوره نهفتگی بیماری طولانی‌تر از زمان بستری بودن بیماران است، نظیر بیشتر آبسه‌های پستان در مادران و یا برخی از عفونتهایی که در نوزادان مشاهده می‌گردد[۲،۳].

روش کار

در این مطالعه ۱۱۸ نمونه از زخم ناحیه عمل بیماران ۷۰-۱۰ سال (۶۳ نفر زن و ۵۵ نفر مرد) که در فاصله خرداد ماه ۱۳۷۶ تا دیماه ۱۳۷۶ در بخش‌های جراحی دو مرکز آموزشی و درمانی در تهران بستری شده بودند، پس از تنظیم پرسشنامه به منظور جستجوی عوامل شایع باکتریایی ایجاد کننده عفونت بیمارستانی جمع‌آوری و بلافاصله در محیط ترانسپورت^(۲) قرار داده شد، سپس این نمونه‌ها در محیط‌های زیر کشت گردیدند.

برای کشت نمونه‌ها از محیط‌های آگارخوندار^(۳)، اتوزین متیلین‌بلو^(۴) و محیط تیوگلیکولات استفاده گردید. ظروف کشت شده به مدت ۷۲-۲۴ ساعت در گرمخانه ۳۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری و سپس جهت شناسایی کلنی‌باکتریها براساس روشهای استاندارد باکتری‌شناسی، آزمایشهای بیوشیمیایی، سرولوژی، تهیه گسترش و رنگ‌آمیزی گرم برای مطالعه میکروسکوپی و همچنین آزمون آنتی‌بیوتیکی طبق روش

KB^(۵) با استفاده از آنتی‌بیوتیکهای رایج انجام گرفت[۴].

نتایج

در این بررسی از ۱۱۸ نمونه زخم بعد از اعمال جراحی بیماران بستری در بخش‌های جراحی مراکز مورد مطالعه، ۵۷ مورد (۴۸/۳٪) کشت مثبت مشخص گردید. کشت‌های مثبت از نمونه‌های زخم براساس انواع آنها شامل ۱۵ نمونه زخم تمیز، ۵ مورد (۸/۸٪)، ۵۳ نمونه زخم تمیز آلوده، ۱۴ مورد (۲۴/۶٪)، ۱۹ نمونه زخم آلوده ۱۶ مورد (۲۸/۱٪) و ۳۱ نمونه زخم کثیف، ۲۲ مورد (۳۸/۵٪) بودند.

شایعترین میکروارگانیسمهای جدا شده از انواع زخمهای جراحی به ترتیب آنتروباکتریاسه‌ها (ایشریشیا کلی - کلبسیلا - آنتروباکتر) ۵۴/۷ درصد، استافیلوکوکوس اورئوس ۱۴ درصد، استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی ۱۲/۳ درصد، پتواستریپترکوکوس آنائروبیوس ۸/۵ درصد، استریپترکوکوس غیر گروه A ۷/۱ درصد و پزودوموناس آئروجینوزا ۳/۴ درصد مشخص گردیدند. (جدول ۱). شایعترین گروه سنی بیماران دچار عفونت گروه ۶۰-۵۰ سال با ۱۲ مورد (۲۱/۱٪) بودند

- ۱- Nosocomial ۲- Stewart
۳- Blood agar
۴-Eosin methylen blue agar
۵-KB: Kirby-Bauer

بهداشتی در اکثر کشورهای جهان محسوب می‌شود، زیرا آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که ۱۲-۵ درصد بیماران بستری در مراکز درمانی گرفتار عفونت بیمارستانی می‌گردند [۳، ۵۶]. براساس نتایج این مطالعه شیوع عفونت بیمارستانی در افراد ۴۸/۳ درصد بوده است که ۵۷/۸ درصد باکتریهای جدا شده، باسیل‌های گرم منفی و ۴۲/۲ درصد در رابطه با کوکسی‌های گرم مثبت می‌باشند، همچنین در این مطالعه بیشترین میزان باکتریهای جدا شده از نمونه زخمهای آلوده و کثیف شامل ای کلی^(۱)، ۸۹/۳ درصد بوده است که همانند مطالعات سایر محققین زخم‌های آلوده و کثیف، بیشترین درصد کشت مثبت را داشته‌اند، که بین این نوع زخمها و بروز عفونت بعد از جراحی اختلاف معنی‌دار دیده شده است ($P < 0.01$). در مطالعات انجام شده در اکثر کشورها انواع زخمهای آلوده و کثیف به‌عنوان فاکتور خطر جهت بروز عفونت زخم جراحی گزارش شده‌اند [۷]. در زخمهای تمیز ۵۳/۴ درصد از باکتریهای جدا شده کوکسی‌های گرم مثبت می‌باشند که بالاترین میزان را استافیلوکوکوس‌ها دارا می‌باشند. در زخمهای تمیز آلوده ۱/۲ درصد باکتریهای جدا شده باسیل‌های گرم منفی شامل: ایشریشیاکلی، کلبسیلا و آنتروباکتر بودند. اگرچه باکتریهای گرم منفی در اکثر مناطق جهان از عوامل بسیار مهم برای بروز عفونت بیمارستانی هستند، اما هنوز هم استافیلوکوکوس‌ها در بیشتر اپیدمیها حایز اهمیت می‌باشند، زیرا استافیلوکوکوس اورئوس مهمترین پاتوژن در بیشتر عفونت‌های بیمارستانی شناخته شده است [۸، ۹].

در این بررسی ۷۶ مورد عفونت متعاقب

باکتریهای جدا شده نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج تعیین گردید، که در باسیل‌های گرم منفی گروه آنتروباکتریاسه‌ها بیشترین میزان حساسیت نسبت به سفالوسپورین‌های نسل سوم (سفتی‌زوکسیم سفنازیدیم و سفتریاکسون) و همچنین سیپروفلوکساسین و نورفلوکساسین دیده می‌شود، در حالیکه ایشریشیاکلی در برابر آمپی‌سیلین، جنتامایسین و کانامایسین درصد مقاومت بالایی را نشان می‌دهد. استافیلوکوکوس اورئوس به وانکویاسین و نورفلوکساسین حساسیت داشته، اما نسبت به پنی‌سیلین ۱۰۰ درصد، اگزاسیلین ۷۰ درصد و جنتامایسین تا ۵۰ درصد مقاومت دارد.

در پزودوموناس و استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی بیشترین میزان حساسیت نسبت به سیپروفلوکساسین و بالاخره در پیتواستریتوکوکوس‌ها حساسیت بالایی به پنی‌سیلین G مشاهده گردید.

بحث

طبق مطالعات انجام شده عفونت بیمارستانی یکی از مشکلات و مسایل مهم

جدول شماره (۱): فراوانی عفونت زخم‌های بعد از عمل جراحی در بیماران مورد مطالعه بر حسب نوع زخم

انواع زخم	موارد مثبت	درصد
تمیز	۵	۸/۸
تمیز آلوده	۱۴	۲۴/۶
آلوده	۱۶	۲۸/۱
کثیف	۲۲	۳۸/۵
جمع	۵۷	۱۰۰

که در محاسبه آماری اختلاف معنی‌دار دیده نشد ($P > 0.05$).

در این مطالعه تعداد موارد مثبت در مردان ۳۰ مورد (۵۲/۶٪) و در زنان ۲۷ مورد (۴۷/۴٪) مشخص گردید که بین توزیع جنسی بیماران و عفونت زخم اختلاف آماری معنی‌دار وجود ندارد ($P = 0.05$). در مطالعه حاضر ارتباط مدت بستری بودن بیماران در مراکز درمانی و موارد کشت مثبت زخم‌های بعد از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفت، که از نظر آماری افزایش مدت بستری بودن بیماران در بیمارستان با بروز عفونت زخم‌ها رابطه معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P < 0.05$).

در این بررسی همچنین حساسیت

جدول شماره (۲): فراوانی عفونت زخم‌های بعد از عمل جراحی در بیماران مورد مطالعه بر حسب عوامل باکتریایی

باکتری	موارد	درصد
آنتروباکتریاسه (ایشریشیاکلی - کلبسیلا - آنتروباکتر)	۳۱	۵۴/۷
استافیلوکوکوس اورئوس	۸	۱۴
استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی	۷	۱۲/۳
پیتواستریتوکوکوس آنائروبیوس	۵	۸/۵
استریتوکوکوس غیر گروه A	۴	۷/۱
پزودوموناس آئروژینوزا	۲	۳/۴
جمع	۵۷	۱۰۰



G تا ۱۰۰ درصد مشاهده گردید.

مطالعات انجام شده در مورد عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت زخم بعد از اعمال جراحی و بطور کلی عفونتهای بیمارستانی نشانگر این است که پیشگیری آنتی بیوتیکی خصوصاً استفاده مناسب از آنتی بیوتیکهای دارای حساسیت بالا، از تجویز چندین آنتی بیوتیک بطور همزمان در بیماران گرفتار این نوع عفونتها خواهد کاست. ضمناً مرکز کنترل بیماریها در آتلانتا توصیه های بهداشتی قابل توجهی را به منظور پیشگیری از عفونت محل جراحی ارائه نموده که موارد مهم آن شامل: تشخیص و درمان عفونتهای مختلف، به حداقل رساندن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پیش از اعمال جراحی، استفاده از محلولهای مناسب جهت ضد عفونی ناحیه و تمیز کردن موضع زخم با حرکت دورانی از مرکز به اطراف، در صورت لزوم پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک خصوصاً سفالوسپورینهای نسل اول و دوم قبل از عمل جراحی، استفاده از فیلتر هوا و تهویه فشار مثبت در اتاق عمل، نمونه گیریهای مکرر از سطوح مختلف اتاق عمل، پوشاندن تمام زخمها با پانسمان استریل خشک به مدت ۴۸-۲۴ ساعت، شستشوی دستها محلول ضد عفونی کننده قبل و بعد از تعویض پانسمان و بالاخره آموزش به بیمار و خانواده او در زمینه مراقبت از زخم، علایم عفونت و گزارش علایم بروز عفونت [۱۴].

۱- Evans

همچنین سیپروفلوکساسین و نوروفلوکساسین ۹۵-۱۰۰ درصد حساسیت نشان دادند که می تواند به علت عدم استفاده از این آنتی بیوتیکها در گذشته باشد، این باکتریها در برابر آمپی سیلین ۷۰ درصد مقاومت داشته اند، اما کلسیلا در برابر جنتامایسین ۹۵ درصد و کانامایسین بیش از ۸۵ درصد حساسیت برخوردار بودند. در این رابطه حساسیت آنتروباکتر به جنتامایسین و کانامایسین ۵۰ درصد مشاهده شد. که مقاومت پزودوموناس نسبت به آمپی سیلین می تواند به علت ترشح بتالاکتاماز و تجزیه دارو باشد [۱۳].

استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به وانکومایسین و نوروفلوکساسین حساسیت بیش از ۹۵ درصد را نشان داده است. اما حساسیت این باکتری به جنتامایسین ۵۰ درصد، در صورتیکه مقاومت آن در برابر پنی سیلین ۱۰۰ درصد، اگزاسیلین ۷۵ درصد، سفالوتین، ۲۵ درصد و سیپروفلوکساسین، ۱۵ درصد تعیین گردید.

در این مطالعه، سویه های استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی نسبت به سیپروفلوکساسین، ۱۰۰ درصد، نوروفلوکساسین، ۸۵ درصد، سفتری زوکسیم، سفتازیدیم و وانکومایسین بیش از ۷۰ درصد به جنتامایسین و سفالوتین بیش از ۵۰ درصد حساسیت داشته اند. سویه های این باکتری نسبت به اگزاسیلین ۸۰ درصد و پنی سیلین ۱۰۰ درصد مقاومت نشان دادند. همچنین حساسیت آنتی بیوتیکی در پیتواستریترکوکوس ها نسبت به پنی سیلین

جراحی روده و لگن رویداده است که ۵۰ درصد کشت مثبت را در برداشته است. مطابق نتایج حاصل از برخی تحقیقات در جهان، جراحی شکم و لگن فاکتور خطر برای بروز عفونت زخم جراحی مطرح شده اند [۱۰]. مطابق تحقیقات انجام شده، کشت مثبت در نمونه های مردان میزان بالاتری را نشان داده است که فاقد رابطه آماری معنی دار می باشد ($P > 0.05$). در مطالعات سایر کشورها میزان زخم عفونی بعد از جراحی در هر دو جنس اختلاف زیادی نداشته است [۱۱].

در این تحقیق بالاترین میزان عفونت در گروه سنی ۶۰-۵۰ سال بدست آمد که فاقد اختلاف معنی دار می باشد ($P > 0.05$). در مطالعه اوانس^(۱) و همکاران در سال ۱۹۹۰ در خصوص فاکتورهای خطر عفونت بیمارستانی، شیوع در افراد بیش از ۵۰ سال میزان بیشتری را نشان داده است، همچنین اقامت بیشتر از ۱۰ روز در مراکز درمانی و بخشهای جراحی از فاکتورهای خطر مهم در کسب عفونت گزارش شده است [۱۲].

در این تحقیق، عفونت در نزد افرادی که بیش از ۷ روز اقامت بیمارستانی داشته اند، دارای میزان بالاتری بوده است و در این رابطه اختلاف معنی دار مشاهده گردید ($P < 0.05$).

در نتایج آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی در باکتریهای جدا شده، باکتریهای ای کی، کلسیلا و آنتروباکتر در برابر سفالوسپورین های نسل سوم (سفتی زوکسیم، سفتی زیدیم و سفتری اکسون) و



مراجع

1. Byrne DV, Lynch W. Wound infection rates the importance of postoperative discharge. *J Hosp Infect* 1994; 26(1):37-43.
2. Brachman PS. Epidemiology of Nosocomial Infection. In *Hospital Infection*. 2nd ed. Boston: Brown Company, 1989; P. 372-375.
3. Mandel D. Bennet's Principles of Infection Diseases. 4th ed. New York: Churchill living Stone, 1995; P.1253-1257.
4. Baron EJ, Finegolds SM. Bailey and Scott's: Diagnostic Microbiology. 8th ed. Philadelphia: Mosby, 1990; P.197-212.
5. Grifoni R, Pierangeli T. Nosocomial infection of the urinary tract in urology patients. *Minerra Med* 1988; 79(1): 29-33.
6. Schattner W. The Global Impact of Hospital Acquired Infection, In *Prevention and Control of Nosocomial Infections*. 1st ed. New York: William and Wilkins, 1987;P.13.
7. Savitz SI, Bottone EJ, Savitz MH, et al. Investigations of the bacteriological factors in clean neurosurgical wounds. *J Neuro Surgery* 1994; 34(3):417-421.
8. Hirose T. The Current epidemics of nosocomial infection in the field of surgery. *Hokkaido Igaka Zasshi*, 1994;69(2):166-169.
9. Jawetz E, Melnick JL, Adelberg EA. *Medical Microbiology*. 21th ed. California: Appleton and Lange, 1998; P.232-233.
10. Barber R, Miransky J, Brown AE, et al. Direct observations of surgical infections. *Arch Surg* 1995; 130:1042-1047.
11. Altemeire WA. Surgical Infections Incisional Wound. In *Hospital Infection*. 2nd ed. Boston: Little and Brown 1989; P. 267.
12. Evans RS, Burke JP, Classen DC, et al. Computerized identification of patients at high risk for hospital acquired infection. *Am Infect Control* 1992; 20(1):4-10.
13. Thomas KH. Inflammation, Infection and Antibiotics. *Current Surgical Diagnosis and Treatment*. 9th ed. Philadelphia: Mosby, 1991; P.117-118.
14. Russel B. Nosocomial infections. *A J M* 1999; 99(6): 24-29. ■

